

Priloga 4: POSEBNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE VRSTE REJNIH ŽIVALI

4.1. Govedo

Skrbnik zagotavlja redno oskrbo parkljev.

V prosti reji molznic mora biti število ležišč enako ali večje od števila živali v čredi (skupini).

Tla ležišča morajo biti polna, z nastiljem ali iz drugih ustreznih materialov, ki preprečujejo poškodbe in zagotavljajo udoben počitek.

4.2. Ovce in koze

Skrbnik zagotavlja redno oskrbo parkljev.

Volnate pasme ovac morajo biti ostrižene najmanj enkrat letno.

Če so koze začasno privezane, je treba zagotoviti, da se žival ne more zaplesti, prav tako je treba zagotoviti, da privezana žival ni izpostavljena napadu psa ali drugih plenilcev.

4.3. Ratiti (noji, emuji in nanduji)

Ratitov ni dovoljeno uporabljati za jahanje ali dirke ter na javnih prireditvah.

Ratitom, starejšim od treh mesecev, skrbnik vsak dan omogoči izpust na prosto, razen v izredno slabih vremenskih pogojih. Če so živali nastanjene v zaprtih prostorih, to obdobje ne sme preseči 10 dni v mesecu.

Ratiti morajo imeti na voljo ustrezeno prašno kopel.

4.4. Purani

Gostota poselitve v nobenem trenutku ne sme biti višja od 58 kg/m² uporabne površine za samce in 52 kg/m² za samice.

Vrednosti CO₂ v objektu ne smejo presegati 2500 ppm. Vrednosti NH³ ne smejo presegati 20 ppm.

Osvetlitev v zgradbah mora biti takšna, da se živali med seboj vidijo. Osvetljene mora biti najmanj 80 % uporabne površine. Kadar je treba, se po nasvetu veterinarja lahko dovoli začasno zmanjšanje stopnje osvetlitve. V desetih dneh po tem, ko so purani naseljeni v objekt, in do treh dni pred predvidenim datumom zakola mora osvetlitev slediti 24-urnemu ritmu in vključevati obdobja teme, ki trajajo skupaj najmanj osem ur, z najmanj enim neprekinjenim obdobjem teme, ki traja najmanj štiri ure, kar ne vključuje trajanja zatemnitve. Zniževanje ur osvetlitve se izvaja postopno.

4.5. Vodna perutnina

Vodna perutnina mora imeti dostop do zunanjega izpusta in dostop do vode za kopanje. Če dostop ni izvedljiv, morajo imeti živali voljo ustrezeno število korit z vodo, oblikovanih tako, da si živali lahko z vodo prelijejo glavo in da vodo lahko s kljunom zajemajo tako, da jo potem brez težav razpršijo po telesu. Zahteva ne velja za umetno vzrejene gosje mladiče, mlajše od treh tednov.

V dolgih obdobjih temperatur pod ničlo pri pogojih proste reje mora imeti vodna perutnina na voljo prosto dostopno zatočišče, ki mora biti dovolj veliko, da sočasno sprejme vse živali, v njem je treba ohranjati zmerno temperaturo in vsebovati mora ustrezni nastilj.

Živim živalim se ne sme puliti perja in puha.

4.6. Gojene ribe

Pakiranje živih rib na ledu kot praksa rokovanja z ribami znotraj ribogojnice ni dovoljeno.

Če se živim ribam odvzemajo jajčeca in sperma, je treba uporabiti anestezijo ali pomirjevalo, primerno določeni vrsti rib.

Kvaliteta vode mora biti primerena vrsti gojenih rib in gostoti naselitve. Parametri kakovosti vode (kisik, amonijak, CO₂, pH, temperatura, slanost in pretok vode) morajo biti znotraj sprejemljivega obsega, ki ohranja normalno aktivnost in fiziologijo posamezne vrste gojenih rib.