

## Priloga 4:

»Priloga 4: Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja in oljk

### 1 UVOD

Tehnološka navodila so namenjena pridelovalcem sadja in oljk poljščin, ki so vključeni v postopek certificiranja Integrirane pridelave sadja in oljk.

Ukrepi v tehnoloških navodilih so razdeljeni na naslednji način:

- zahteve – pridelovalec mora pri izvajanju integrirane pridelave upoštevati zahteve iz tehnoloških navodil. Če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi neskladje, lahko pridelovalec to neskladje odpravi;
- prepovedi – če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi, da pridelovalec krši prepovedi iz tehnoloških navodil pri izvajanju integrirane pridelave, zavrne izdajo certifikata ali razveljavi že izdani certifikat.

### 2 KOLOBAR

#### Zahteve:

- pri napravi nasada jagod je treba upoštevati kolobar. Kolobar je široko zastavljen in raznolik z menjavo družin rastlin in vključevanjem dosevkov oziroma vmesnih posevkov. V petih letih je na isti površini največ 2-krat jagoda kot glavna kultura;
- pri pridelavi jagodičja v inertnih substratih (npr. hidroponsko gojenje) je obvezna pridelava v zaprtem krogotoku.

### 3 GNOJENJE OZ. PREHRANA RASTLIN

#### Zahteve:

- če je založenost tal s hranili slabša od razreda optimalne preskrbljenosti tal (stopnja C), se za založno gnojenje (do starosti nasada treh let) lahko porabi največ 250 kg/ha  $P_2O_5$  in 300 kg/ha  $K_2O$  na leto;
- vodi se evidence o porabi gnojil;
- gnojiti je treba v skladu z založenostjo tal, ki se določi glede na analizo tal na globini 0-30 cm. Analiza tal se izvede najmanj vsakih 5 let;
- ciljna količina organske snovi v tleh mora biti optimalna glede na tip tal (preglednica 1);
- če se uporabi največji dovoljeni letni vnosa čistega dušika (preglednica 2), je treba skupno količino dušika razdeliti na 2 do 3 obroke, pri čemer en obrok ne sme biti višji od 40 kg N/ha;
- analiza tal na fosfor (P), kalij (K), organsko snov in pH se izvede pred napravo nasada za določanje založenosti tal in v obstoječih nasadih, najmanj 1-krat vsakih pet let in ločeno za vsako značilno talno enoto posebej;
- uporaba do 40 kg/ha dušika za pospeševanje mineralizacije organskih snovi (zastirke) pri sadnih vrstah je dovoljena, če se uporabi zastirka z višjim C:N razmerjem od 18:1 in ta vrednost se ne upošteva pri skupni letni količini dušika;
- dovoljen letni vnos dušika za posamezne sadne vrste je določen v preglednici 2;
- odmerek dušika ne sme presegati vrednosti predpisanih v predpisu, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kljub temu, da ciljne vrednosti za doseganje največjih pridelkov pri posameznih poljščinah presegajo te vrednosti.

**Preglednica 1: Povezava med tipom tal ter optimalno vsebnostjo organske snovi (v %)**

| TEKSTURA TAL  | VSEBNOST ORGANSKE SNOVI (%) |           |        |
|---------------|-----------------------------|-----------|--------|
|               | NIZKA                       | OPTIMALNA | VISOKA |
| Lahka         | 1                           | 1 – 2,5   | 2,5    |
| Srednje težka | 1,5                         | 1,5 – 2,5 | 3,5    |

| TEKSTURA TAL | VSEBNOST ORGANSKE SNOVI (%) |           |        |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------|
|              | NIZKA                       | OPTIMALNA | VISOKA |
| Težka        | 2,5                         | 2,5 – 4   | nad 4  |

**Preglednica 2: Največji dovoljeni letni vnos dušika (kg/ha) po sadnih vrstah**

| Sadna vrsta      | N (kg/ha)                                       |
|------------------|-------------------------------------------------|
| breskev          | 105                                             |
| marelica         | 105                                             |
| češnja           | 105                                             |
| češplja          | 105                                             |
| oljka            | 105                                             |
| kaki             | 90                                              |
| jablana, hruška* | 60<br>(pri sortah 'Zlati delišes' in 'Gala' 90) |
| aktinidija       | 105                                             |
| oreh             | 105                                             |
| leska            | 90                                              |
| kostanj          | 105                                             |
| jagodičje        | 55                                              |

- pri jablani in hruški se največje dovoljene količine iz preglednice 2 lahko povečajo na največ 105 kg/ha, vendar le ob izpolnjevanju enega od treh pogojev, če je iz rezultatov predhodno opravljene  $N_{min}$  analize razvidno pomanjkanje (preglednica 3) ali če je dolžina enoletnega prirastka iz terminalnih brstov manjša od 30 cm ali če je vsebnost organske snovi v tleh nižja od 4 %;

**Preglednica 3: Gnojenje z dušikom glede na vrednosti  $N_{min}$  metode**

| N-min vrednost<br>kg/ha | N-mineralizacija | Gnojenje z dušikom kg/ha |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| pod 30                  | zmerna           | 30–50                    |
|                         | dobra            | pod 30                   |
| 30–50                   | zmerna           | 0–30                     |
|                         | dobra            | 0                        |
| nad 50                  | zmerna - dobra   | 0                        |

- pri gnojenju s fosforjem in kalijem je treba upoštevati rezultate analize tal. V primeru, da rezultati analize tal presežejo optimalno stopnjo preskrbljenosti (C stopnja) s hranili je treba gnojenje prilagoditi odvzemu hranil s pridelkom (preglednica 4), pri založenosti tal stopnje D se gnoji s

polovičnim odmerkom odvzema s pridelkom, pri založenosti tal stopnje E se gnojenje opusti za obdobje 5 let oz. do naslednje analize tal;

- upoštevati je treba časovne mejnike, znotraj katerih je gnojenje z dušikovimi gnojili prilagojeno. Od 1. marca do 1. septembra ni omejitev, od 1. septembra do 15. oktobra se lahko uporabi največ 40 kg N/ha;

**Preglednica 4: Odvzem hranil s povprečnim pridelkom različnih sadnih vrst.**

| Sadna vrsta     | Pridelek (t/ha) | Hranila (kg/ha) |                               |                  |     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----|
|                 |                 | N               | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO |
| jablana         | 40              | 20              | 13                            | 60               | 2   |
| hruška          | 40              | 30              | 10                            | 70               | 5   |
| češnja          | 12              | 26              | 5                             | 23               | 2   |
| sliva           | 20              | 10              | 5                             | 42               | 2   |
| marelica        | 20              | 18              | 9                             | 71               | 2   |
| breskev         | 15              | 15              | 9                             | 36               | 2   |
| aktinidija      | 20              | 31              | 11                            | 54               | 2   |
| malina          | 15              | 29              | 7                             | 26               | 5   |
| drugo jagodičje | 20              | 37              | 7                             | 47               | 4   |
| borovnica       | 15              | 21              | 2                             | 10               | 1   |

- ob upoštevanju največjega dovoljenega vnosa in odvzema hranil s pridelkom je treba pri gnojenju upoštevati uveljavljene norme (preglednica 5).

**Preglednica 5: Norme za gnojenje različnih sadnih vrst z dušikom, fosforjem, kalijem, magnezijem in borom ob različnih količinah pridelka in optimalno založenih srednje težkih tleh (stopnja C).**

| Sadna vrsta     | Pridelek (t/ha) | N (kg/ha)          | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (kg/ha) | K <sub>2</sub> O (kg/ha) | MgO (kg/ha) | B (mg/kg) |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| jablana, hruška | < 40            | 70                 | 35                                    | 90                       | 15          | 0,4       |
|                 | 40 – 50         | 80                 | 40                                    | 110                      | 20          | 0,5       |
|                 | > 50            | 90<br>(hruške 100) | 45                                    | 130                      | 25          | 0,6       |
| sliva           | < 20            | 70                 | 35                                    | 65                       | 5           | 0,4       |
|                 | 20 – 25         | 90                 | 45                                    | 80                       | 10          | 0,5       |
|                 | > 25            | 105                | 55                                    | 95                       | 15          | 0,6       |
| češnja          | < 8             | 50                 | 25                                    | 50                       | 10          | 0,4       |
|                 | 8 – 12          | 70                 | 35                                    | 65                       | 15          | 0,5       |
|                 | > 12            | 90                 | 45                                    | 80                       | 20          | 0,6       |
| breskev         | < 20            | 60                 | 30                                    | 55                       | 10          | 0,4       |
|                 | 20 – 25         | 80                 | 40                                    | 70                       | 15          | 0,5       |
|                 | > 25            | 90                 | 45                                    | 75                       | 20          | 0,6       |
| marelica        | < 10            | 70                 | 35                                    | 60                       | 15          | 0,4       |
|                 | 10 – 15         | 90                 | 45                                    | 75                       | 20          | 0,5       |
|                 | > 15            | 105                | 55                                    | 90                       | 25          | 0,5       |
| aktinidija      | < 15            | 40                 | 10                                    | 60                       | 5           | /         |
|                 | 20              | 50                 | 15                                    | 75                       | 5           | /         |
|                 | > 25            | 65                 | 20                                    | 90                       | 10          | /         |
| jagoda          | 20              | 55                 | 50                                    | 130                      | /           | /         |
| malina          | 20              | 55                 | 40                                    | 80                       | /           | /         |
| ribez           | 20              | 55                 | 40                                    | 120                      | /           | /         |

| Sadna vrsta        | Pridelek (t/ha) | N (kg/ha) | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (kg/ha) | K <sub>2</sub> O (kg/ha) | MgO (kg/ha) | B (mg/kg) |
|--------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| robida             | 20              | 55        | 35                                    | 65                       | /           | /         |
| ameriška borovnica | 15              | 35        | 25                                    | 60                       | /           | /         |
| kosmulja           | 17              | 55        | 35                                    | 80                       | /           | /         |
| oljka              | < 4             | 70        | 15                                    | 80                       | /           | /         |
|                    | 4 – 6           | 90        | 25                                    | 110                      | /           | /         |
|                    | > 6             | 105       | 30                                    | 130                      | /           | /         |
| oreh               | 15 – 45         | 75 – 105  | 15                                    | 30                       | /           | /         |
| leska              | 12 – 36         | 62 – 86   | 12                                    | 20                       | /           | /         |
| kostanj            | 10 – 30         | 80 – 100  | 10                                    | 15                       | /           | /         |

#### Prepovedi:

- prepovedana prekoračitev letnega vnosa dušika podanega v preglednici 2, oziroma največje skupne količine 105 kg/ha;
- prekoračitev mejne vrednost letnega vnosa hranil;
- vnos hranil preko oroševalnega namakalnega sistema;
- gnojenje z muljem oziroma kompostom iz komunalnih čistilnih naprav;
- uporaba komposta, ki po kakovosti ne ustreza zakonodaji;
- v obdobju od odpadanja listja do cvetenja sadnega drevja ali do ozelenitve tal v nasadu ni dovoljeno dodajanje mineralnih lahkotopnih dušikovih gnojil, prav tako ni dovoljeno v obdobju od konca junija do jeseni. Izjeme so za češnjo in lesko, dovoljeno je dognojiti po obiranju, vendar v okviru zakonsko predpisanih rokov, za oreh, dovoljeno je gnojiti z N od konca marca oziroma od brstenja do konca junija ter za oljko, dovoljeno je gnojiti z N od druge polovice februarja do sredine junija.

## 4 NAMAKANJE

#### Zahteve:

- v trajnih nasadih koščičarjev je treba pred postavitvijo namakalnega sistema pridobiti osnovne podatke o lastnostih tal. Treba je narediti mehansko analizo tal, s pomočjo katere se lahko ugotovi količino rastlinam dostopne vode v tleh in določi se maksimalen obrok namakanja. V obdobju namakanja je treba spremljati meteorološke parametre, kot so padavine, temperatura ter vodna bilanca tal;
- treba je voditi evidenco o porabi vode za namakanje;
- za merjenje padavin je treba imeti merilno napravo;
- oskrba z vodo je prilagojena potrebam sadnih rastlin in travne ruše, vremenskim razmeram in tipu tal (preglednica 6,7);
- dodajanje hranil preko namakalnega sistema je možno s kapljičnim namakanjem in mikro razpršilci pod krošnjami. Količina hranil, porabljena pri fertirigaciji se všteje v skupno letno dovoljeno količino hranil.

#### Prepovedi:

- prepovedana je uporaba prekomernih količin vode, ki bi povzročile izpiranje hranil v globlje plasti tal in podtalnico ter negativno vplivale na kakovost pridelka.

#### Preglednica 6: Optimalni vnos vode v enkratnem odmerku v nasad glede na teksturo tal.

| TEKSTURA TAL |       | KAPLJIČNO NAMAKANJE IN MIKRO RAZPRŠILCI |                      | OROŠEVANJE |                      |
|--------------|-------|-----------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
|              |       | (mm)                                    | (m <sup>3</sup> /ha) | (mm)       | (m <sup>3</sup> /ha) |
| Peščena      | LAHKA | 15                                      | 150                  | 35         | 350                  |

| TEKSTURA TAL                    |                  | KAPLJIČNO<br>NAMAKANJE IN<br>MIKRORAZPRŠILCI |                      | OROŠEVANJE |                      |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                 |                  | (mm)                                         | (m <sup>3</sup> /ha) | (mm)       | (m <sup>3</sup> /ha) |
| Ilovnata<br>peščena             | SREDNJE<br>TEŽKA | 20                                           | 200                  | 45         | 450                  |
| Peščena<br>ilovica              |                  |                                              |                      |            |                      |
| Peščeno<br>glinasta<br>ilovica  |                  |                                              |                      |            |                      |
| Melj                            |                  |                                              |                      |            |                      |
| Meljasta<br>ilovica             |                  |                                              |                      |            |                      |
| Ilovica                         | TEŽKA            | 25                                           | 250                  | 55         | 550                  |
| Peščena glina                   |                  |                                              |                      |            |                      |
| Meljasto<br>glinasta<br>ilovica |                  |                                              |                      |            |                      |
| Glinasta<br>ilovica             |                  |                                              |                      |            |                      |
| Glina                           |                  |                                              |                      |            |                      |

**Preglednica 7: Prikaz povprečne letne bruto norme namakanja za jagode v območju osrednje Slovenije (OS. SLO) in subpanonskem območju (SUBP.).**

| Način<br>pridelave         | Lahka tla |       | Srednje težka tla |       | Težka tla |       |
|----------------------------|-----------|-------|-------------------|-------|-----------|-------|
|                            | OS. SLO   | SUBP. | OS. SLO           | SUBP. | OS. SLO   | SUBP. |
| Enkrat<br>rodna<br>jagoda  | 36        | 307   | 26                | 248   | 24        | 237   |
| Večkrat<br>rodna<br>jagoda | 140       | 289   | 101               | 234   | 96        | 222   |

## 5 OSKRBA TAL V NASADU

### Zahteve:

- v vseh nasadih, razen jagodičja in zaščitnih prostorov, je obvezna takojšnja ozelenitev medvrstnega prostora. V medvrstnem prostoru je treba vzdrževati rastlinski pokrov različnih rastlin in v vrstni sestavi pokrova prevladujejo trave. Zaradi zaprtega krogotoka hranil je treba pokošene rastline pustiti v nasadu;
- če je nasad na terasah, je košnja brežin teras obvezna.

### Prepovedi:

- širina herbicidnega pasu pod drevesi ne sme presegati ¼ širine medvrstnega prostora (izjema za lupinarje);
- neozelenel medvrstni prostor, izjema so nasadi jagodičja in zaščitni prostori;
- odvoz pokošenih rastlin iz nasada.

## 6 REZ

### Zahteve:

- vsakoletna prilagojena izvedba rezi (razen v primeru jagodnjaka).

## 7 STROJNO TEHNIČNI POGOJI

### Zahteve:

Za oskrbo nasadov v integrirani pridelavi je nujna naslednja minimalna strojna oprema:

- **pogonski stroji:** traktorji, prilagojeni delovnim razmeram v nasadu in kakovostni izvedbi del;
- **stroji za varstvo nasadov:** traktorski pršilniki, katerih tehnična primernost morata biti potrjena z veljavnim znakom o pregledu naprav za nanašanje fitofarmaceutskih sredstev. Samo izjemoma je v manjših nasadih alina težko dostopnih delih nasada sadnih vrst in oljk dovoljena uporaba nahrbtnih pršilnikov ali škropilnic. Pri izvajanju varstva z zastrupljenimi vabami in uporabi nahrbtnih pršilnikov ali škropilnic ni omejitev pri velikosti površine. V obeh primerih mora biti postopek dela s strojem vnaprej pripravljen in preverjen pred vsako sezono;
- **stroji za oskrbo vrstnega prostora:** stroji za mehansko obdelavo tal, košnjo in škropilniki za aplikacijo herbicidov;
- **stroji za oskrbo medvrstnega prostora:** mulčerji s stalno ali s spremenljivo delovno širino.

## 8 MINIMALNI TEHNOLOŠKI UKREPI ZA POSAMEZNE SADNE VRSTE

### Zahteve:

- izvajanje rezi in drugih ukrepov, ki zagotavljajo večletno pridelovanje sadja;
- vzdrževanje medvrstnega prostora z minimalno 2- kratnim letnim mulčenjem, razen pri jagodičju in zaščiteneih prostorih;
- v pasu pod drevesi rastejo samo nizke rastline;
- izvajanje minimalnega zdravstvenega varstva rastlin.

## 9 INTEGRIRANO VARSTVO SADNIH VRST IN OLJK

### Zahteve:

- redno spremljanje pojava in razvoja škodljivih organizmov;
- pri uporabi FFS je treba upoštevati določbe zapisane na etiketi in v navodilu za uporabo posameznega FFS;
- pri škropljenju je treba uporabiti FFS, ki so dovoljena za uporabo v ekološki pridelavi. Potrebno število tovrstnih škropljenj po posamezni sadni vrsti je navedeno v preglednici 8;
- izvajalec varstva rastlin mora biti ustrezno strokovno usposobljen o rabi FFS, kar se dokazuje s potrdilom o pridobitvi znanj iz fitomedicine;
- za aplikacijo FFS se uporabljajo tehnično brezhibne in redno pregledane naprave za nanos FFS;
- redno spremljanje pojava in razvoja škodljivih organizmov;
- za zatiranje škodljivih organizmov se izbere metoda varstva rastlin na podlagi lastne presoje in izkušenj ob upoštevanju prognostičnih obvestil Javne službe zdravstvenega varstva rastlin;
- pri odločanju za izvedbo ukrepov varstva rastlin je treba upoštevati pragove škodljivosti za škodljive organizme, če ti pragovi obstajajo;
- s ukrepi je treba zadrževati škodljive organizme pod pragom gospodarske škodljivosti, oziroma le-te kemično zatirati, šele ko je dosežen gospodarski prag škodljivosti;
- upočasniti je treba razvoj odpornosti škodljivih organizmov z menjavanjem pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja ter upoštevanjem največjega dovoljenega števila tretiranj in časovni interval med njimi;
- ekološka sredstva se uporabijo samostojno ali v kombinaciji z drugimi sredstvi. V število škropljenj so všteta tudi sredstva, ki so dovoljena v ekološki pridelavi in so uporabljena kot nadomestilo za FFS, ki vsebujejo a.s., ki je kandidatka za zamenjavo.

### Prepovedi:

- uporaba FFS, ki ni skladna s tem pravilnikom;

- prekoračene največje dovoljene mejne vrednosti ostankov FFS ali prisotnost nedovoljene aktivne snovi v odvzetem vzorcu.

#### **UPORABA FFS, KI JIM V LETU PRIDELAVE POTEČE ODLOČBA O REGISTRACIJI ALI BODO NA NOVO REGISTRIRANA PO OBJAVI TEHNOLOŠKIH NAVODIL V SLOVENIJI**

##### **Zahteve:**

- uporabljajo se FFS, ki so navedena v tej prilogi. Sredstva, ki so navedena v prilogi in jim med letom poteče registracija, pridelovalec lahko uporablja do zaključka rastne dobe, razen v primeru, če drugače ne odredi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
- novi FFS, ki se na trgu pojavijo po izdaji te priloge, se lahko v letu registracije uporabljajo skladno s pogoji registracije in navedbami v navodilu za uporabo novega FFS, četudi ti FFS niso navedeni v tej prilogi.

**Preglednica 8: Prikaz minimalnega števila škropljenj z aktivnimi snovmi in predlagani FFS, dovoljenimi v ekološki pridelavi ter minimalno število kandidatk za zamenjavo z ostalimi registriranimi aktivnimi snovmi pri različnih sadnih vrstah.**

| Sadna vrsta | Minimalno število škropljenj s sredstvi – dovoljena v EKO pridelavi in brez FFS, ki vsebuje baker (uporaba samostojno ali v kombinaciji z drugimi sredstvi) | Predlagani FFS, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi                                   | Minimalno število »kandidatk«, ki jih mora pridelovalec zamenjati z ostalimi dovoljeni aktivnimi snovmi, izven predpisanega seznama. | Seznam 'kandidatk' za zamenjavo                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jablana     | 5                                                                                                                                                           | V preglednicah za varstvo jabolane pripravki in aktivne snovi označene z zeleno barvo. | 3                                                                                                                                    | Chorus 50 WG<br>Chorus forte<br>Difof<br>Score 250 EC<br>Mavita 250 EC<br>Difcor 250 EC<br>Difenzone<br>Duaxo koncentrat<br>Sercadis plus<br>Luna experience<br>Pomax<br>Switch 62,5 WG<br>Geoxe<br>Affirm<br>Affirm opti<br>Shirudu<br>Stomp aqua<br>Pirimor 50 WG |



|                   |   |                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hruška            | 3 | V preglednicah za varstvo hruške pripravki in aktivne snovi označene z zeleno barvo.                 | 1 | Score 250 EC<br>Mavita 250 EC<br>Duaxo koncentrat<br>Difol<br>Chorus 50 WG<br>Chorus forte<br>Sercadis plus<br>Luna experience<br>Pomax<br>Switch 62,5 WG<br>Geoxe<br>Pomax<br>Affirm opti<br>Karate zeon 5 CS<br>Shirudo<br>Stomp aqua |
| breskev/nektarina | 3 | V preglednicah za varstvo breskev in nektarin so pripravki in aktivne snovi označeni z zeleno barvo. | 1 | Affirm<br>Chorus 50 WG<br>Luna experience<br>Mavita 250 EC<br>Pirimor 50 WG<br>Score 250 EC<br>Switch 62,5 WG                                                                                                                           |
| marelica          | 3 | V preglednicah za varstvo marelic so pripravki in aktivne snovi označeni z zeleno barvo.             | 0 | Ni primernega kandidata za zamenjavo.                                                                                                                                                                                                   |
| češnja/višnja     | 3 | V preglednicah za varstvo češenj in višenj so pripravki in aktivne snovi označeni z zeleno barvo.    | 0 | Ni primernega kandidata za zamenjavo.                                                                                                                                                                                                   |
| sliva/češplja     | 3 | V preglednicah za varstvo sliv in češpelj so pripravki in aktivne snovi označeni z zeleno barvo.     | 0 | Ni primernega kandidata za zamenjavo.                                                                                                                                                                                                   |

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kaki   | 0 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | Za zatiranje kakijeve listne pegavosti je registriran le pripravek na osnovi difenokonazola, ki pa nima ustreznega nadomestka za zatiranje kakijeve listne pegavosti ( <i>Plurivorosphaerella nawae</i> ), ki bi se lahko uporabljal v ekološki pridelavi.           |
| smokve | 0 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | Registrirani sredstvi sta že dovoljeni za ekološko pridelavo                                                                                                                                                                                                         |
| jagode | 1 | <b>Botector</b> ( <i>Aureobasidium pullulans</i> (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%))<br><b>Amylo-X</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 (25%) )<br><b>Taegro</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 (13%))<br><b>Serenade ASO</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 (1,4%))<br><b>Prestop</b> ( <i>Clonostachys rosea</i> strain J1446 ( <i>Gliocladium catenulatum</i> strain J1446) (32%))<br><b>Polyversum, Univerzalni fungicid</b> ( <i>Pythium oligandrum</i> M1 (25%))<br><b>AQ-10</b> ( <i>Ampelomyces quisqualis</i> sev AQ10 (58%))<br><b>Vitisan, Karbicare</b> (kalijev hidrogen karbonat)<br><b>Biotip sulfo 800 SC, Thiovit Jet</b> (žveplo) | 1 | Zamenjava pripravka <b>Signum</b> (za uporabo proti sivi plesni) s pripravkom ali <b>Botector</b> ali <b>Amylo-X</b> ali <b>Polyversum</b> ali <b>Univerzalni fungicid</b> ali <b>Serenade ASO</b> (samo na prostem) ali <b>Taegro</b> (samo v zaščitelih prostorih) |

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                            |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   | <b>Azatin EC</b> (azadirachtin A (2,6%))<br><b>Lepinox Plus</b> ( <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (15%))<br><b>Agree WG</b> ( <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> (50%))<br><b>Laser Plus, Laser 240 SC</b> (spinosad (spinosin A+spinosin D))<br><b>Naturalis</b> ( <i>Beauveria bassiana</i> , sev ATCC 74040 (0,02%))<br><b>Botanigard OD/ WP</b> ( <i>Beauveria bassiana</i> , sev GHA)<br><b>Položomor bio vaba, Solabiol, Bio Plantela, Ferramol, Naturen bio</b><br>(železov (III) fosfat)                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                            |
| ameriške borovnice | 1 | <b>Amylo-X</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 (25%) )<br><b>Taegro</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 (13%))<br><b>Serenade ASO</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 (1,4%))<br><b>Curatio-žvepleno apnena brozga</b> (kalcijev polisulfid (apneno žveplo) (38%))<br><b>Biotip sulfo 800 SC, Thiovit Jet, Microthiol special / disperss</b> (žveplo)<br><b>Laser 240 SC, Laser Plus</b> (spinosad (spinosin A+spinosin D))<br><b>Ovitex</b> (parafinsko olje (81,7%))<br><b>Celaflor Naturen</b> (olje navadne ogrščice)<br><b>Agree WG</b> ( <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> (50%))<br><b>Lepinox Plus</b> ( <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (15%) ) | 1 | Zamenjava pripravka <b>Signum</b> (za uporabo proti sivi plesni) s pripravkom ali <b>Amylo-X</b> ali <b>Serenade ASO</b> ali <b>Taegro</b> |
| maline             | 1 | <b>AQ-10</b> ( <i>Ampelomyces quisqualis</i> sev AQ10 (58%) )<br><b>Vitisan, Karbicare</b> (kalijev hidrogen karbonat)<br><b>Amylo-X</b> ( <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 (25%) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Zamenjava pripravka <b>Signum</b> (za uporabo proti sivi plesni) s pripravkom ali <b>Amylo-X</b>                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Thiovit jet, Biotip Sulfo 800 SC, Microthiol special, Microthiol disperss, Sulfar, Microthiol SC</b> (žveplo)<br><b>Agree WG</b> ( <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> (50%))<br><b>Laser 240 SC, Laser Plus</b> (spinosad (spinosin A+spinosin D))<br><b>Ovitex</b> (parafinsko olje (81,7%))<br><b>Celaflor Naturen</b> (olje navadne ogrščice)<br><b>Naturalis</b> ( <i>Beauveria bassiana</i> , sev ATCC 74040 (0,02%))<br><b>Botanigard WP</b> ( <i>Beauveria bassiana</i> , sev GHA) |  | ali <b>Taegro</b> ali <b>Serenade ASO</b> (samo na prostem) |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|

## **10 NAČINI VARSTVA RASTLIN**

### **Uporaba sredstev za kemično redčenje in rastnih regulatorjev**

#### **Zahteve:**

- dovoljena uporaba sredstva za kemično redčenje in regulacijo rasti, ki so za ta namen registrirana v Republiki Sloveniji.

## 11 INTEGRIRANO VARSTVO SADJA IN OLJK

Sredstva označena z zeleno barvo so dovoljena v ekološki pridelavi.

Za pridelavo namiznega grozdja se smiselno uporabljajo navodila za integrirano pridelavo vinskega in namiznega grozdja.

### 11.1 INTEGRIRANO VARSTVO JABLAN

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIVNA SNOV  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO    | ODMEREK   | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jablanov škrlup<br>( <i>Venturia inaequalis</i> ) | <b>Higienski ukrep:</b> pometanje odpadlega listja v medvrstni prostor in mulčenje oz. odstranjevanje listja iz nasada<br><br><b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategija zatiranja v obdobju nevarnosti primarnih okužb temelji na preventivni uporabi kemičnih FFS - fungicidov z daljšim preventivnim delovanjem (kontaktnih, iz skupine anilinopirimidinov, SDHI in strobilurinskih pripravkov).</li> <li>V primeru ekstremnih vremenskih razmer (listje mokro več kot 48 ur, padlo več kot 25 mm dežja, od zadnjega škropljenja minilo 96 ur in več) imajo prednost pripravki z daljšim kurativnim, sistemskim delovanjem (IBE-triazoski</li> </ul> | Cu hidroksid  | Kocide 2000                  | 2 kg/ha   | ČU 3xL                     | Letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg čistega bakra na ha - potrebno upoštevati pri št. tretiranj s FFS na osnovi a.s.baker |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cu oksiklorid | Cuprablau Z 35 WP            | 3,0 kg/ha | ČU 3xL                     |                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Cuprablau Z 35 WG            | 3,0 kg/ha | ČU-3xL                     |                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Cuprablau Z 50 WP-se ne trži | 2 kg/ha   | ČU 3xL                     |                                                                                                                                                                           |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO       | ODMEREK                                        | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>pripravki), ki se uporabijo v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informacije o izpolnjenih pogojih za pojav primarnih okužb in jakost le teh so za sadjarske lokacije, ki so vključene v mrežo Agromet dostopne na Agrometeorološkem portalu in v prognostičnih obvestilih Javne službe ZVR, ki napove tudi začetek in konec nevarnosti pojava primarnih okužb.</li> <li>Dolžina presledkov med škropljenji je v času trajanje primarnih okužb je odvisna od vremenske napovedi trajanja in količine padavin ter hitrosti prirasta listne mase (3 do 5 dni).</li> <li>Po koncu primarnih okužb se v nasadih, kjer so uspešno obvladali primarne okužbe, presledki med škropljenji podaljšajo (do 14 dni.). Dolžina presledka je odvisno od količine padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja, potrebno škropljenje ponoviti pred naslednjimi padavinami. V nasadih, kjer se pojavijo pege na listih se priporoča preventivna uporaba kontaktnih fungicidov pred napovedanimi padavinami oz. na vsakih 7 do 8 dni.</li> </ul> | metiram                        | Polyram DF                      | 2,0 kg/ha                                      | 28 dni 3xL                 | Uporaba za zmanjševanje okužb j. škrlupa, negativen učinek na plenilske pršice.<br><b>Zaloge v uporabi do:28.11.2024</b>                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dodin                          | Syllit 400 SC                   | 1,9 L/ha                                       | 60 dni 2xL                 | Sredstva se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo kaptan, fenoksikarb, cink, baker, apno, z alkalnimi sredstvi ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Syllit 544 SC <b>se ne trži</b> | 1,4 L/ha                                       | 60 dni 2 xL                |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ciprodinil (anilinopirimidin)  | Chorus 50 WG                    | 0,45 kg/ha                                     | 21 dni 3xL                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pirimetanil (anilinopirimidin) | Batalion 450 SC                 | 0,7-1,0 L/ha                                   | 28 dni 3xL                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Pyrus 400 SC                    | 1,0 L/ha                                       | 56 dni 3xL                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Pyramid                         | 0,375 L/višinski m krošnje/ha                  | 28 dni 3xL                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                 | max. 1,125 L/ha                                |                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Scala                           | 0,375 L/višinski m krošnje/ha, max. 1,125 L/ha | 56 dni 4xL                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | Avalon                          | 1,125 L/ha                                     | 56 dni 3x                  |                                                                                                                                                                                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO      | ODMEREK                                                   | KARENCA, dovoljeno št. rab                                                  | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                               | Erune 40 SC                    | 1,125 L/ha                                                | 56 dni 3xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        |                               | Pretil                         | 1,125 L/ha                                                | 56 dni 3xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        |                               | Mythos <b>se ne trži</b>       | 1,5 L/ha                                                  | 56 dni 4xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        |                               |                                |                                                           | <b>Zaloge v prodaji do: 29.10.2024:<br/>Zaloge v uporabi do: 29.10.2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        | ditianon                      | Delan 700 WG                   | 0,75 kg/ha                                                | 42 dni 6xL                                                                  | - v odmerku 0,75 kg/ha, v 7 dnevnem razmiku, od BBCH 57-72;<br><br>- v odmerku 0,5 kg/ha, v 5 dnevnem razmiku od (BBCH 73-79).<br><br>Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi. |
|                     |        |                               | Alcoban                        | 0,75 kg/ha                                                | 42 dni 3xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        | ditianon + kalijeve fosfonati | Delan pro                      | 2,5 L/ha                                                  | 35 dni 6xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        | ditianon + pirimetanil        | Faban                          | 1,2 L/ha                                                  | 56 dni 4xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        | ditianon + ciprodinil         | Chorus forte <b>se ne trži</b> | 2,0 L/10.000 m <sup>2</sup> listne površine max. 3,6 L/ha | 35 dni 2xL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |        |                               |                                |                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO       | ODMEREK                                                      | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | folpet + difenokonazol                         | Difol                           | 3,5 L/ha                                                     | 110 dni 3xL                |                                                                                                                 |
|                     |        | kaptan                                         | Merpan 80 WDG                   | 1,88 kg/ha                                                   | 28 dni 10xL                |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Captan 80 WG                    | 2,0 kg/ha                                                    | 28 dni 10xL                |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Orthocide 80 WG                 | 2,0 kg/ha                                                    | 28 dni 10xL                |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Scab 80 WG                      | max.1,9 kg/ha                                                | 21 dni 10xL                |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Scab 480 SC                     | 3,13 L/ha                                                    | 21 dni 10xL                |                                                                                                                 |
|                     |        | kaptan + kalijevi fosfonati                    | Merplus <b>se ne trži</b>       | 2 L/ha                                                       | 28 dni 8xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        | difenokonazol (triazol)                        | Score 250 EC                    | 0,2 L/ha                                                     | 21 dni 3x L                | Sistemične pripravke na osnovi triazolov, strobilurinov in SDHI pripravke vedno mešamo z dotikalnimi fungicidi. |
|                     |        |                                                | Difcor 250 EC                   | 0,2 L/ha                                                     | 14 dni 3xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Difenzone                       | 0,2 L/ha                                                     | 21 dni 4xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Mavita 250 EC <b>se ne trži</b> | 0,2 L/ha                                                     | 21 dni 3x L                |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Duaxo koncentrat                | max. 3,3L/ha                                                 | 14 dni 3xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        | tetrakonazol (triazol)                         | Domark 100 EC                   | 0,4 L/ha                                                     | 14 dni 2xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        | mefentriflukonazol (triazol)                   | Revyona                         | 1,3 L/10.000 m <sup>2</sup> površine listne stene max. 2L/ha | 28 dni 2xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        | difenokonazol+ fluksapiroksat (triazol + SDHI) | Sercadis plus                   | 1,2 L/ha                                                     | 35 dni 2xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        | fluksapiroksad (SDHI)                          | Sercadis                        | 0,25-0,3 L/ha                                                | 35 dni 3xL                 | Uporaba: za zmanjšanje okužb j. škrlupa                                                                         |
|                     |        | krezoksim-metil (strobilurin)                  | Stroby WG <b>se ne trži</b>     | 0,2 kg/ha                                                    | 28 dni 4xL                 |                                                                                                                 |
|                     |        | trifloksistrobin (strobilurin)                 | Zato 50 WG <b>se ne trži</b>    | 100 – 150 g/ha                                               | 21 dni 4xL                 |                                                                                                                 |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                              | UKREPI                                                                                                                                                                      | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                       | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | boskalid + piraklostrobin | Bellis <b>se ne trži</b>    | 0,8 kg/ha                                     | 7 dni 3 xL                 | Zaloga v prodaji do: 31.1.2024<br>Zaloga v uporabi do: 31.1.2025                 |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | fluopiram + fosepil - Al  | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1kg/1meter višine krošnje/ha (max. 3,0 kg/ha) | 28 dni 3xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | kalijev hidrogen karbonat | Karbicare                   | 5 kg/ha                                       | 1 dan 5xL                  | Uporaba: za zmanjševanje okužb j. škrupa                                         |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Vitisan                     | 2,5 kg/meter višine krošnje (max. 7,5 kg/ha)  | 1 dan 6xL                  |                                                                                  |
| <b>Jablanov škrlup</b><br>( <i>Venturia inaequalis</i> )<br><br><b>Jablanova pepelovka</b><br>( <i>Podosphaera leucotricha</i> ) |                                                                                                                                                                             | žveplo                    | Cosan                       | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 | Uporaba: za zatiranje jablanove pepelovke in zmanjšanje okužb jablanovega škrupa |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Kumulus DF                  | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Microthiol disperss         | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Microthiol special          | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Pepelin                     | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Thiovit Jet                 | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Vindex 80 WG                | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Sulfar                      | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                 |                                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Vertipin                    | 7 L/ha                                        | 3 dni 12xL                 |                                                                                  |
| <b>Jablanova pepelovka</b><br>( <i>Podosphaera leucotricha</i> )                                                                 | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redno odstranjevanje okuženih poganjkov (primarno okužene -v obdobju zimske rezi; redno</li> </ul> | žveplo                    | Azumo WG c                  | 7,5 kg/ha                                     | 7 dni 6xL                  | Vsi pripravki na osnovi žvepla imajo stranski akaricidni učinek in delujejo tako |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                           | Biotip Sulfo 800 SC         | 6 – 7,5 l/ha                                  | 7 dni 8xL                  |                                                                                  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                           | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO    | ODMEREK                                                   | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                               | <p>odstranjevanje sekundarno okuženih poganjkov - do konca rasti primarnih poganjkov)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Od brstenja do cvetenja: za zmanjšanje infekcijskega potenciala bolezni uporaba pripravkov na osnovi žvepla v najvišje dovoljenih odmerkih (pogoj: T zraka nad 15 °C); od cvetenja naprej: uporaba v nižjih odmerkih</li> <li>Od fenološke faze rdeči balon do končane rasti primarnih poganjkov: uporabo specifično delujočih fungicidov iz skupine strobilurinov in SDHI pripravkov v času največje nevarnosti primarnih ter času sekundarnih okužb z jablanovo pepelovko.</li> </ul> |                                | Pol-sulphur 800 SC           | 6 – 7,5 l/ha                                              | 7 dni 8xL                  | na škodljive kot koristne pršice.                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fluopiram + tebukonazol        | Luna experience              | 0,25 L/1m višine krošnje/ha max. 0,75 L/ha                | 14 dni 2xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fluopiram + fosepil - Al       | Luna Care <b>se ne trži</b>  | 1kg/meter višine krošnje/ha max. 3,0 kg/ha                | 28 dni 3xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fluksapiroksad                 | Sercadis                     | 0,25L/ha                                                  | 35 dni 3xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | difenokonazol + fluksapiroksat | Sercadis plus                | 0,72 L/ha                                                 | 35 dni 2xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | penkonazol                     | Topas 100 EC                 | 0,5 L/ha                                                  | 14 dni 3xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | difenkonazol                   | mefentriflukonazol           | 1,3 L/10.000 m <sup>2</sup> površine listne s. max. 2L/ha | 28 dni 2xL                 | Uporaba: za zmanjševanje okužb j. pepelovke      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Duaxo koncentrat             | max. 3,3L/ha                                              | 14 dni 3xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | krezoksim-metil (strobilurin)  | Stroby WG <b>se ne trži</b>  | 0,2 kg/ha                                                 | 28 dni 4xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trifloksistrobin (strobilurin) | Zato 50 WG <b>se ne trži</b> | 100 – 150 g/ha                                            | 21 dni 4xL                 |                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | boskalid + piraklostrobin      | Bellis <b>se ne trži</b>     | 0,8 kg/ha                                                 | 7 dni 3 xL                 |                                                  |
| <b>Mušja pegavost jabolk</b><br>( <i>Schizothyrium pomi</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fludioksonil                   | Geoxe                        | max. 0,45 kg/ha                                           | 3 dni 2xL                  | Vsi pripravki, ki se uporabljajo za obvladovanje |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                             | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO    | ODMEREK                                       | KARENCA, dovoljeno št. rab                                                                      | OPOMBE                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sajavost jabolk</b><br>( <i>Gloeodes pomigena</i> )          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Z agrotehničnimi ukrepi napada mušje pegavosti in sajavosti ne moremo omiliti.</li> <li>Skladiščimo samo zdrave plodove, obrane v času tehnološke zrelosti, brez mehanskih poškodb in sončnih ožigov.</li> </ul> <p><b>Neposredne metode varstva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vsi pripravki, ki so registrirani za zatiranje oz. zmanjševanje okužb skladiščnih bolezni delujejo na mušjo pegavost in sajavost jablan.</li> <li>Če je zadnja dekada avgusta obilna s padavinami, potrebno opraviti dve škropljenji (upoštevamo karenci!).</li> <li>Pranje plodov izvedljivo samo, če razpolagamo z ustrezno opremo.</li> </ul> | ciprodinil + fludioksonil      | Switch 62,5 WG               | 0,08 %, max 1 kg/ha                           | 3 dni 3xL                                                                                       | skladiščnih bolezni, delujejo na mušjo pegavost ( <i>S. pomi</i> ) in sajavost jabolk ( <i>G.pomigena</i> ).<br><br><b>Banjo:</b> za zatiranje črnih listnih pegavosti ( <i>Alternaria</i> spp.) |
| <b>Alternarijska pegavost</b><br>( <i>Alternaria</i> spp.)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pirimetanil + fludioksonil     | Pomax                        | 1,6 L/ha                                      | 5 dni 2xL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fluazinam                      | Banjo                        | 0,7 L/ha                                      | 60 dni 3x od razvojne faze rožnatih popkov do faze sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 57-73) |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grenka gniloba jabolk</b><br>( <i>Gloeosporium</i> spp.)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fluopiram + tebukonazol        | Luna experience              | 0,25 L/1m višine krošnje/ha<br>max. 0,75 L/ha | 14 dni 2xL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Siva plesen</b><br>( <i>Botryotinia fuckeliana</i> )         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pirimetanil                    | Scala                        | 1,5 L/ha                                      | 56 dni 4xL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trifloksistrobin (strobilurin) | Zato 50 WG <b>se ne trži</b> | 100 – 150 g/ha                                | 21 dni 4xL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | boskalid +piraklostrobin       | Bellis <b>se ne trži</b>     | 0,8 kg/ha                                     | 7 dni 3 xL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kalijev hidrogen karbonat      | Vitisan                      | 2,5 kg/meter višine krošnje                   | 1 dan 6xL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Navadna sadna gniloba</b><br>( <i>Monilinia fructigena</i> ) | <p><b>Higienski ukrep:</b> Odstranjevanje mumij plodov iz nasada.</p> <p>Izvajanje ukrepov, ki zmanjšajo možnosti poškodb plodov (škodljivci, ptiči, veter...) ali poškodb ob obiranju in transportu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fluopiram + tebukonazol        | Luna experience              | 0,25 L/1m višine krošnje/ha<br>max. 0,75 L/ha | 14 dni 2xL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pirimetanil                    | Scala                        | 1,5 L/ha                                      | 56 dni 4xL                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                 | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivna uporaba registriranih kemičnih FFS in pripravkov na osnovi mikroorganizmov (biotično varstvo).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pirimetanil + fludioksonil                                           | Pomax                     | 1,6 L/ha               | 5 dni 2xL                  |                                                                                                                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo – X                 | 1,5 – 2,5 kg/ha        | 6 x L                      |                                                                                                                                   |
| <b>Cvetna gniloba jablan</b><br><i>(Monilia laxa)</i>               | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intenzivno izrezovanje napadenih poganjkov.</li> <li>Ker na glivo delujejo dotikalni in sistemski fungicidi, ki se jih uporablja za zatiranje škrlupa, so jablane posredno ustrezno zaščitene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                           |                        |                            | Ker na glivo delujejo dotikalni in sistemski fungicidi, ki jih uporabljamo proti škrlupu, so jablane posredno ustrezno zaščitene. |
| <b>Gniloba koreninskega vratu</b><br><i>(Phytophthora cactorum)</i> | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri zasnovi nasada se poskrbi za ustrezno zračnost, prepustnost in strukturno tal.</li> <li>Uredimo odvodnjavanje meteornih vod in poskrbimo, da voda ne zastaja v kolesnicah.</li> <li>Sadi se sadike, ki imajo čim višje cepilno mesto ali s posredovalko (pri sorti Topaz)</li> <li>Pri vzdrževanju negovane ledine se poskrbi, da ne poškodujemo debla.</li> <li>Redno zatiranje plevelov v vrstnem prostoru, da je koreninski vrat čim manj časa moker.</li> <li>Pri dosajevanju je potrebno temeljito prezračiti zemljo in dodati veliko organskih gnojil.</li> </ul> <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemično zatiranje glive s FFS, ki je že okužila deblo navadno ni uspešno.</li> <li>Okužena drevesa je treba čimprej odstraniti skupaj s koreninami.</li> </ul> | Cu oksiklorid                                                        | Cuprablau Z 35 WG         | 15 – 35 g / 100 L vode | 1xL                        | Za uporabo na posamičnih drevesih, za manjše uporabe.                                                                             |
| <b>Jablanov rak</b> ( <i>Nectria galligena</i> )                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sajenje neokuženih sadik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cu oksid                                                             | Nordox 75 WG              | 1,6 kg/ha              | ČU 3xL                     |                                                                                                                                   |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIVNA SNOV                 | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                       | KARENCA, dovoljeno št. rab               | OPOMBE |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Pri občutljivih sortah (npr. Gala, Braeburn, Jonagold, Zlati delišes, Pinova in Fuji) se izogiba rezi, ki povzroča nastanek velikih ran.</li></ul> <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Intenzivno izrezovanje rakastih vej in premazovanje ran s pasto za celjenje ran.</li><li>Jesensko in spomladansko škropljenje s pripravki na osnovi bakra. Sledi uporaba dotikalnih fungicidov za zatiranje škrlupa, ki posredno vplivajo za zatiranje te bolezni.</li><li>S kemičnim varstvom na ugodnih legah (višje in vlažne lege) bolezni ne moremo popolnoma preprečiti.</li><li></li></ul> | fluopiram + tebukonazol      | Luna experience             | 0,25 L/1m višine krošnje/ha<br>max. 0,75 L/ha | 14 dni 2xL                               |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fluopiram + fosetil - Al     | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1kg/meter višine krošnje/ha<br>max. 3,0 kg/ha | 28 dni 3xL                               |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                             |                                               |                                          |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                             |                                               |                                          |        |
| <b>Hrušev ožig</b><br>( <i>Erwinia amylovora</i> ) | Bakterija <i>Erwinia amylovora</i> spada med nadzorovane nekarantenske škodljive organizme za naslednje sadne rastline: jabolana, hruška, kutina,. Več o hruševem ožigu je na IVR portalu..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             |                                               |                                          |        |
|                                                    | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Preventivna uporaba bakrovih pripravkov do fenološke faze stadija mišjega ušesca BBCH 00-53.</li><li>V času cvetenje: uporaba bakrovih pripravkov ter kemičnih FFS in biotičnih pripravkov, ki so registrirani za zatiranje hruševega ožiga je ob ugodnih vremenskih razmerah za razvoj bakterije</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cu hidroksid + Cu oksiklorid | Badge WG                    | 2,9 kg/ha                                     | ČU 2xL                                   |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cu hidroksid                 | Kocide 2000                 | 2 kg/ha                                       | ČU 3xL                                   |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cu oksiklorid                | Cuprablau Z 35 WP           | 0,48 - 2,5 kg/ha                              | ČU 3x do konca cvetenja, 5 x po cvetenju |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Cuprablau Z 35 WG           | 0,27 - 2,5 kg/ha                              | ČU 4xL                                   |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cu oksid                     | Nordox 75 WG                | 1- 1,6 kg/ha od BBCH 00 do 53; 0,3 kg/ha od   | ČU 3xL                                   |        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                       | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV                                          | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                    | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                           | <p>smiselna le v nasadih, kjer se hrušev ožig redno pojavlja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosledno odstranjevanje okuženih poganjkov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                             | BBCH 57 - 69                               |                            |                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fosetil-Al                                            | Aliette flash               | 3,75 kg/ha.                                | 28 dni 3xL                 |                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fluopiram + fosetil - Al                              | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1kg/meter višine krošnje/ha max. 3,0 kg/ha | 28 dni 3xL                 |                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bacillus amyloliquefaciens QST 713                    | Serenade ASO                | 8 L/ha                                     | 6 x L                      |                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747 | Amylo – X                   | 1,5 – 2,5 kg/ha                            | 6 x L                      |                              |
| Jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum)    | <p><b>Neposredne metode varstva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivca od fenološke faze začetka brstenja do konca cvetenja (BBCH 51 - 69): <ul style="list-style-type: none"> <li>Stresanje vej - ponjava pod drevesom: Prag škodljivosti: če se na 100 vej ulovi več kot 20 do 30 hroščkov se lahko pričakuje večjo škodo</li> <li>Pregled brstov pod stereo - mikroskopom: Prag škodljivosti: v nasadu z manjšim cvetnim nastavkom - več kot 20% brstov z vbodi ali več kot 15% brstov z odloženimi jajčeci, v nasadih z obilnim cvetnim nastavkom: prag v obeh primerih višji za 10%.</li> </ul> </li> <li>Ob preseganju praga škodljivosti uporaba kemičnih FFS - insekticidov registriranih za zatiranje j. cvetožerja.</li> <li>Napadu najbolj izpostavljeni nasadi obdani z gozdovi. V oddaljenosti oddaljenih več kot 50 do 80 m od gozda, se stopnja napada značilno zmanjša, zato je zatiranje smiselno le v omenjenem območju.</li> </ul> | piretrin                                              | Asset Five                  | 0,96 L/ha                                  | ČU 2XL                     | Čas tretiranja: BBCH 51 - 54 |
| Jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea) | <p><b>Agrotehnični ukrep:</b> plitvo obdelovanje tal pod drevesi uniči del bub, ki se nahajajo v tleh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | acetamiprid                                           | Mospilan 20 SG              | 0,04% max:0,4 kg/ha                        | 14 dni 2xL                 |                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | azadirachtin A                                        | Neemazal –T/S               | 1,5 L/ha/m                                 | ČU 4XL                     |                              |
|                                           | <p><b>Neposredne metode varstva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivke od fenološke faze stadij balona do konca cvetenja (BBCH 59 - 69):</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                             |                                            |                            |                              |





| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UKREPI                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV     | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                | ODMEREK        | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prag škodljivosti na 100 pregledanih poganjkov                                                                                                                                    |                  |                                                          |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Listne uši                                                                                                                                                                        | Pred cvetenjem   | Po cvetenju                                              |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zelena jablanova uš                                                                                                                                                               | 10 do 15 kolonij | 8 do 10 kolonij                                          |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mokasta jablanova uš                                                                                                                                                              | 1 do 2 koloniji  | 1 do 2 koloniji                                          |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jablanova uš šiškarica                                                                                                                                                            | 3 do 5 kolonij   | 5 do 8 kolonij (več ko 5 napadenih listov na 100 listov) |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jablanova travna uš                                                                                                                                                               | 80 kolonij       |                                                          |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V juniju prag povečamo za eno do dve koloniji.                                                                                                                                    |                  |                                                          |                |                            |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pred cvetenjem lahko prihaja do prerazmnožitve predvsem mokaste j. uši, ob preseganju praga škodljivosti, v fenološki fazi mišjega ušesca do rdečega balona, uporaba registriranih insekticidov za zatiranje mokaste uši.</li><li>Po cvetenju in v času intenzivne rasti poganjkov ob preseganju praga škodljivosti uporaba registriranih insekticidov za zatiranje listnih uši.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                          |                |                            |        |
| Krvava uš<br>(Eriosoma lanigerum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Posredni- preventivni ukrepi:                                                                                                                                                     | pirimikarb       | Pirimor 50 WG                                            | max 0,75 kg/ha | 14 dni 1xL                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | spirotetramat    | Movento 100 SC                                           | 1,9 L/ha       | 21 dni 2xL                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Izogibanje nastanka večjih ran na vejah in deblih dreves.</li><li>Pomen zdravstvenega stanja sadik - brez prisotnosti krvave uši.</li></ul> |                  |                                                          |                |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neposredne metode varstva:                                                                                                                                                        |                  |                                                          |                |                            |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Spremljanja razvoja, migracije in številčnosti populacije krvave uši:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                          |                |                            |        |
| Prag škodljivosti po cvetenju: 5-8 kolonij na 100 poganjkov (lahko manj, če gre za mlajši nasad in so uši na večletnem lesu ogrodnih vej ter povzročajo velike rakaste rane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                          |                |                            |        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pri vzdrževanju naravnega ravnovesja, omejevanju ter zmanjševanju populacije krvave uši ima najpomembnejšo vlogo endoparazitska osica krvavkin najezdnik (Aphelinus mali H.)</li><li>Nalet in številčnost populacije krvavkinega najezdnika v nasadu lahko spremljamo s pomočjo rumenih lepljivih plošč (RLP), ki jih aprila ob koncu cvetenja obesimo v vrste.</li><li>Ob prerazmnožitvi populacije krvave uši strategija zatiranja temeljiti na ravnovesju med kemičnim in biotičnim načinom varstva.</li><li>Zelo pomembno: v nasadu poskušamo ohraniti pojav prve generacije krvavkinega najezdnika, saj ta v poletnem času z razvojem novih generacij eksponentno naraste in pripomore k učinkovitemu zmanjševanju populacije krvave uši.</li></ul> |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                          |                |                            |        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                            | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV      | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                       | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Zato potrebno ob preseganju praga škodljivosti uporabo insekticidov usmeriti v obdobje od druge dekade meseca maja do konca prve dekade junija, ko je populacija krvavkinega najezdnika najmanjša in je hkrati največja migracija krvave uši tako s koreninskega vratu proti krošnji navzgor, kot z vej večletnega lesa na enoletne poganjke.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |                               |                            |                                              |
| Jabolčni zavijač<br>(Cydia pomonella)                                                                                                                                                          | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivca:<ul style="list-style-type: none"><li>S feromonskimi vabami (od fenološke faze intenzivno odpadanje venčnih listov BBCH 67 do zadnje dekade avgusta): <u>Prag škodljivosti: 5 do 7 metuljev/teden/vabo</u></li><li>Redni pregledi plodov na črvivost. <u>Prag škodljivosti: prva generacija: 0,3 % črvivih</u></li></ul></li><li>Zatiranje škodljivca poleg kemične metode varstva, vključuje možnost integracije nekemičnih oz. metod varstva z nizkim tveganjem (biotehniške, biotične, fizikalne). Biotehniška in biotična metoda varstva se lahko izvaja samostojno ali kot dopolnilna metoda varstva.</li></ul> | klorantraniliprol | Coragen                   | max. 0,27 L/ha                | 14 dni 2xL                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Voliam                    | 18 mL/hL -                    |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Shenzi 200 SC             | 270 mL/ha                     |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tebufenozid       | Mimic                     | 0,06 % oz. 0,9-1 L/ha         | 14 dni 3xL                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | spinetoram        | Delegate 250 WG           | 0,3 kg/ha                     | 7 dni 1x L                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | acetamiprid       | Mospilan 20 SG            | 0,04% (max. 0,4 kg/ha)        | 14 dni 2xL                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | emamektin         | Affirm                    | 1 kg/ha/m (max. 4 kg/ha)      | 7 dni 2xL                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Affirm opti               | 2,0 kg/ha                     | 7 dni 3xL                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ciantraniliprol   | Exirel                    | 50 – 60 mL/hL (max. 0,9 L/ha) | 7 dni 2 xL                 | za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piriproksifen     | Harpun                    | 0,0375-0,05 % oz. do 0,5 L/ha | ČU 2xL                     |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | spinosad          | Laser plus                | 0,3 L/ha                      | 7 dni 1xL                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | virus granuloze   | Carpovirusine             | 1 L/ha                        | 3 dni 3xL                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Madex max                 | 50 mL/ha/1meter krošnje       | ni potrebna 10XL           |                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kodlemon          | Rak 3                     | 500 dis./ha                   | ni potrebna                | Zaloge v uporabi do: 22.7.2025               |
| Biotehniška metoda varstva: metoda zbežanja (konfuzija): uporaba feromonskih razpršilcev (dispensorjev) ali uporaba naprave za razprševanje feromonov. Čas postavitve napove Javna služba ZVR. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                               |                            |                                              |
| Biotična metoda varstva: uporaba pripravkov na osnovi virusa granuloze                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                               |                            |                                              |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO    | ODMEREK                                | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brstni in listni skukači</b>                    | <b>Neposredne metode varstva:</b><br><br>Ločeno zatiranje teh škodljivcev po navadi ni potrebno, saj z insekticidi, ki se uporabljajo za zatiranje jabolčnega zavijača posredno zatremo tudi zavijače lupine sadja ter brstne in listne sukače. Več pozornosti in spremljanja je treba nameniti nasadom, kjer se za obvladovanja jabolčnega zavijača uporablja metoda zbejanja kot samostojna metoda. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivca: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Možnost spremljanja s feromonskimi vabami</i> (od začetka cvetenja BBCH 60 do konca septembra);</li> <li>– <i>Pregled brstov zgodaj spomladi: Prag škodljivosti: več kot 5-6% zapredenih brstov ali poganjkov</i></li> </ul> </li> <li>Ob preseganju praga škodljivosti smiselno zatiranje prezimnih gosenic s kemičnimi FFS in sredstvi na osnovi mikroorganizmov (biotično varstvo). <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Pregled poganjkov in plodičev poleti: Prag škodljivosti: 3-5% zapredenih poganjkov ali začetne poškodbe na 0,5% plodov.</i></li> </ul> </li> </ul> | klorantraniliprol                           | Coragen Voliam Shenzi 200 SC | max. 0,27 L/ha<br>18 mL/hL - 270 mL/ha | 14 dni 2xL                 |                                                                                              |
| Rjavi šipkov zavijač ( <i>Archips rosana</i> )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tebufenozid                                 | Mimic                        | 0,06 % oz. 0,9-1 L/ha                  | 14 dni 3xL                 |                                                                                              |
| Rdeči brstni sukač ( <i>Spilonota ocellana</i> )   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | spinetoram                                  | Delegate 250 WG              | 0,3 kg/ha                              | 7 dni 1x L                 |                                                                                              |
| Sivi brstni sukač ( <i>Hedya nubiferana</i> )      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | emamektin                                   | Affirm opti                  | 2,0 kg/ha                              | 7 dni 3xL                  |                                                                                              |
| <b>Zavijači lupine sadja</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ciantraniliprol                             | Exirel                       | 50 – 60 mL/hL (max. 0,9 L/ha)          | 7 dni 2xL                  | za zmanjševanje popuacije                                                                    |
| Sadni zavijač ( <i>Adoxophyes reticulana</i> )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | azadirahatin A                              | Neemazal –T/S                | 1,5 L/ha/m                             | ČU 4XL                     |                                                                                              |
| Rjavi sadni lupinar ( <i>Archips podana</i> )      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i> | Delfin WG                    | 0,75 kg/ha                             | ni potrebna 6 xL           | Registrirani tudi za zatiranje <b>malega zimskega pedica</b> ( <i>Operophtera brumata</i> ). |
| Pasasti sadni lupinar ( <i>Pandemis heparana</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | Lepinox Plus                 | 1 kg/ha                                | ni potrebna                |                                                                                              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Bacillus thuringiensis var. aizawai</i>  | Agree                        | 1 kg/ha                                | ni potrebna 3XL            |                                                                                              |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                            | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV                                                                                                                                                                                                                                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                                      | ODMEREK                       | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|
|                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Ob preseganju praga škodljivosti smiselno zatiranje s sredstvi na osnovi mikroorganizmov (biotično varstvo).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                               |                            |        |
| <b>Ameriški kapar</b><br>( <i>Quadriaspidiotus perniciosus</i> )<br><br><b>Vejičasti kapar</b><br>( <i>Lepidosaphes ulmi</i> ) | <b>Posredni- preventivni ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pomen zdravstvenega stanja sadik - brez prisotnosti kaparjev.</li><li>Strganje debel na katerih prezimujejo ličnike - črni ščitek (ameriški k.) in jajčeca pod ščitki samic (vejičasti kapar).</li></ul> <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izrezovanje napadenih vejic.</li></ul> Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivca. <ul style="list-style-type: none"><li>– Pregled lesa v fazi mirovanja: <u>Prag škodljivosti: v času brstenja: kaparji na več kot 2 do 3% vejic ali prisotnost ščitkov na več kot 1 % plodov v preteklem letu</u></li></ul> | spirotetramat                                                                                                                                                                                                                                                             | Movento 100 SC                                                                 | 1,9 L/ha                      | 21 dni 2xL                 |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | piriproksifen                                                                                                                                                                                                                                                             | Harpun                                                                         | 0,0375-0,05 % oz. do 0,5 L/ha | ČU 2xL                     |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | parafinsko olje                                                                                                                                                                                                                                                           | Ovitex                                                                         | 20 L/ha                       | ČU 1XL                     |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | olje navadne ogrščice                                                                                                                                                                                                                                                     | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okr. Rast.-koncentrat | 2 - 3 %                       | ni potrebna 3 x L          |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ob preseganju praga škodljivosti uporaba oljnih pripravkov v fenološki fazi BBCH 52 - 54 (pogoj: T zraka nad 15 °C) ali pripravka na osnovi piriproksifena do BBCH 59; v obdobju izleganja ličink prve in druge generacije pa uporaba pripravka na osnovi spirotetramata. |                                                                                |                               |                            |        |
| <b>Rdeča sadna pršica</b><br>( <i>Panonychus ulmi</i> )                                                                        | <b>Posredni- preventivni ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pomen zdravstvenega stanja sadik - brez prisotnosti pršic</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | parafinsko olje                                                                                                                                                                                                                                                           | Belo olje Karsia                                                               | 10 L/ha na m višine krošnje   | ČU 1XL                     |        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | (max. 30 L/ha)                |                            |        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                                      | ODMEREK                                    | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>prelk.(<i>Tetranychus</i> sp.), med katere sodi tudi rdeča sadna pršica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzdrževane ekoloških niš za plenilske pršice (<i>Typhlodromus pyri</i>, <i>Amblyseius andersoni</i>...)</li> <li>Premišljena izbira fungicidov in insekticidov, ki ne prizadenejo naravnih sovražnikov pršic prelk</li> </ul> <p><b>Neposredne metode varstva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivke <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>Pregled lesa v času mirovanja:</u> <u>Prag škodljivosti: več kot 400 zimskih jajčec na dolžinski meter vejic dve in tri-letnega lesa</u></li> <li>– <u>Pregled listov v rastni dobi:</u> <u>Prag škodljivosti: spremljamo razmerje med pršicami prelkami - rdečo sadno pršico in plenilskimi pršicami (zaželeno je razmerje 1:10, takrat ukrepanje ni potrebno); Število pršic na list: produkt 500 - prag je presežen, ko zmnožek med številom pršic na list in številom dni do obiranja preseže vrednot 500</u></li> </ul> </li> </ul> <p>Na začetku spremljamo pršice na listih v rozetah in kratkih poganjkih (dve in tri-letni les), v juniju na listih sredi poganjka, v juliju na vrhu.</p> |                                            | Frutapon                                                                       | 10 L/ha na m višine krošnje (max. 30 L/ha) | ČU 1XL                     |                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | Ovitex                                                                         | 20 L/ha                                    | ČU 1XL                     |                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | olje navadne ogrščice                      | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okr. Rast.-koncentrat | 2- 3 %                                     | ni potrebna 3 x L          |                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | klofentezin                                | Apollo 50 SC                                                                   | 0,4 L/ha                                   | 35 dni 1xL                 | <b>Zaloge v uporabi do: 11.11.2024</b>                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | acekvinocil                                | Kanemite SC                                                                    | 0,625 L/ha/m                               | 14 dni 1XL                 | Stransko delovanje na <b>jablanovo rjasto pršico (<i>Aculus schlechtendali</i>)</b> . |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heksitiazoks                               | Nissorun 10 WP                                                                 | 0,33kg/ha/m (max.1,0 kg/ha)                | 28 dni 1xL                 |                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | Nissorun 250 SC <b>se ne trži</b>                                              | 0,13L/ha/m, (max. 0,39 L/ha)               | 28 dni 1xL                 |                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tebufenpirad                               | Shirudo (staro ime Masai)                                                      | 0,5 kg/ha                                  | 7 dni 1xL                  | Stransko delovanje na <b>jablanovo rjasto pršico (<i>Aculus schlechtendali</i>)</b> . |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | milbemektin                                | Milbeknock                                                                     | 0,625 l/ha/m                               | 14 dni 2xL                 |                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Beauveria bassiana</i> , sev ATCC 74040 | Naturalis                                                                      | 1,5 L/ha                                   | ni potrebna                |                                                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                   | KARENCA, dovoljeno št. rab                               | OPOMBE                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p>Osnovni pristop pri zatiranju pršic prelek je vzdrževanje naravnega ravnotežja med njimi in plenilskimi pršicami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnost vnosa plenilskih pršic (<i>Amblyseius andersoni</i>, <i>Neoseiulus californicus</i>) oz. njihovih komercialnih produktov za biotično varstvo.</li> <li>Uporaba oljnih pripravkov oz. kemičnih FFS - akaricidov, le ob preseganju praga škodljivosti.</li> </ul>                                                                                                                             |               |                           |                           |                                                          |                                                                    |
| <b>Jablanova rjasta pršica</b><br>( <i>Aculus schlechtendali</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremljanje pojava škodljivke: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>vizualni pregledi nasadov</i>: ravnamo se po napadu v preteklem letu oz. v sezoni smo pozorni na barvo listja (vihanje listov, sprememba barve spodnje strani listov).</li> </ul> </li> <li>Vsi preventivni ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri rdeči sadni pršici.</li> <li>V starejših nasadih te pršice ni potrebno zatirati. V mladih nasadih opravimo škropljenje z akaricidi, če je napadenih več kot 25% poganjkov.</li> </ul> |               |                           |                           |                                                          |                                                                    |
| <b>Jablanova listna hrčica</b><br>( <i>Dasineura mali</i> )        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Največ škode povzroča na mladih drevesih, ker zastoj rasti poganjkov otežuje oblikovanje rodnega volumna</li> <li>Posebej je ne zatiramo. Stranski učinek imajo tudi pripravki, ki jih uporabimo za zatiranje j. grizlice, j. zavijača in uši.</li> <li>V času poletne razi lahko izrežemo napadene poganjke, preden oranžne žerke druge in tretje generacije, ki sesajo predvsem ob glavni listni žili, zaključijo razvoj in se preselijo v tla, kjer se zabubijo.</li> </ul>                                               | spirotetramat | Movento 100 SC            | 1,9 L/ha                  | 21 dni 2xL<br><br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> |                                                                    |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> )      | <b>Neposredne metode varstva:</b><br>Uspešno zatiranje škodljivke je zelo težavno in zahteva integriranje različnih metod varstva rastlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | acetamiprid   | Mospilan 20 SG            | 0,05%<br>(max. 0,5 kg/ha) | 14 dni 2xL                                               |                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | deltametrin   | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                  | 7 dni 2xL                                                |                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Decis 100 EC              | 0,75 mL/ha                | 7 dni 1xL                                                |                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | piretrin      | Asset Five                | 0,96 L/ha                 | ČU 2XL                                                   | Delno zmanjševanje številčnosti populacije marmorirane smrdljivke. |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fizikalni ukrep: med učinkovite ukrepe sodi uporaba protiinsektnih mrež, ki preprečijo stenicom dostop do plodov. Protiinsektne mreže je potrebno namestiti takoj po cvetenju. Za ta namen se uporablja enovrstni in bločni sistem mrež.</li> <li>Biotični ukrep: možnost vnosa parazitoidne osice <i>Anastatus bifasciatus</i> oz. njenega komercialnega produkta.</li> </ul>                                                                                                                                               |               |                           |                           |                                                          |                                                                    |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                       | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                | KARENCA, dovoljeno št. rab | OPOMBE                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemični ukrep: uporaba insekticidov je upravičena samo v primeru prisotnosti odraslih stenic in ličink v nasadu. Prisotnost le teh ugotovimo z vizualnim pregledom rastlin oz. s spremljanjem ulova na feromonske vabe. Uporaba insekticidov vpliva na zmanjšanje populacije, vendar ne v zadostni meri, da bi popolnoma preprečila škodo na pridelku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                        |                            |                        |
| <b>Glogova bolšica</b><br>( <i>Cacopsylla melanoneura</i> )<br><br><b>Jablanova bolšica</b><br>( <i>Cacopsylla mali</i> ) | Bolšice iz rodu <i>Cacopsylla</i> so pomembni prenašalci nekaterih fitoplazem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | spirotetramat  | Movento 100 SC            | 1,9 L/ha               | 21 dni 2xL                 |                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | acetamiprid    | Mospilan 20 SG            | 0,04% (max. 0,4 kg/ha) | 14 dni 2xL                 |                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | piretrin       | Asset Five                | 0,96 L/ha              | ČU 2XL                     | Delno zatiranje bošic. |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | azadirahthin A | Neemazal –T/S             | 1,5 L/ha/m             | ČU 4XL                     |                        |
|                                                                                                                           | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistematično zatiranje teh dveh bolšic je smiselno v nasadih, kjer se opaža povečan obseg pojava metličavost jablane (apple proliferation) - bolezni, ki jo povzroča fitoplazma, ki je kot Candidatus Phytoplasma mali uvrščena med nadzorovane nekarantenske škodljive organizme (NNŠO) za sadilni in razmnoževalni material jablane (<i>Malus</i>). Okužuje lahko tudi druge lesnate rastline.</li> <li>V nasadih, okuženih z metličavostjo, spremljamo prisotnost bolšic z RLP ali vizualnimi pregledi.</li> <li>Pred brstenjem je zatiranje glogove bolšice upravičeno, če se pri stresanju vej ulovita več kot dve bolšici na vejo. Dovoljeno je uporabiti insekticide, ki imajo delovanje na bolšice in se smejo uporabiti na jablanah. O zatiranju se je potrebno posvetovati s strokovnjaki Javne službe ZVR.</li> <li>K zmanjševanju populacije bolšic pripomore tudi z odstranjevanje koreninskih izrastkov in zatiranje plevelov.</li> <li>V jesenskem obdobju, ko so bolezenski znaki jasno vidni, potrebno drevesa odstraniti skupaj s koreninami.</li> </ul> |                |                           |                        |                            |                        |

## 11.2 INTEGRIRANO VARSTVO HRUŠK

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                | UKREPI | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                               |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hrušev škrlup</b><br>( <i>Venturia pyrina</i> ) |        | Cu hidroksid | Kocide 2000               | 2 kg/ha | ČU 3xL                    | Letna količina uporabljenega čistega |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AKTIVNA SNOV                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO       | ODMEREK      | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p><b>Higienski ukrep:</b> pometanje odpadlega listja v medvrstni prostor in mulčenje oz. odstranjevanje listja iz nasada</p> <p><b>Neposredne metode varstva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izrezovanje krastavih vejic.</li> <li>Strategija zatiranja enaka kot pri jablanovem škrlupu. Le uporaba triazolskih ali SDHI fungicidov pri hruškah manj pogosta, kot pri jablani.</li> <li>Jakost okužb pred cvetenjem je pri hruški pogosto večja kot pri jablani.</li> <li>Presledki med škropljenji v aprilu 7 do 10 dni, v maju 10 do 12, nato 12 do 16 dni, odvisno od padavin in stanja okužb v nasadu.</li> </ul> |                                | Cuprablau Z 50 WP se ne trži    | 2 kg/ha      | ČU 3xL                    | bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg čistega bakra na ha - potrebno upoštevati pri št. tretiranj s FFS na osnovi a.s.baker.                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | metiram                        | Polyram DF                      | 2,0 kg/ha    | 28 dni 3xL                | Uporaba za zmanjševanje okužb h. škrlupa, negativen učinek na plenilske pršice.<br><br><b>Zaloge v uporabi do: 28.11.2024</b>                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dodin                          | Syllit 400 SC                   | 1,9 L/ha     | 60 dni 2xL                | Sredstva se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo kaptan, fenoksikarb, cink, baker, apno, z alkalnimi sredstvi ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Syllit 544 SC <b>se ne trži</b> | 1,4 L/ha     | 60 dni 2 xL               |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ciprodinil (anilinopirimidin)  | Chorus 50 WG                    | 0,45 kg/ha   | 21 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pirimetanil (anilinopirimidin) | Batalion 450 SC                 | 0,7-1,0 L/ha | 28 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Pyrus 400 SC                    | 1,0 L/ha     | 56 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO      | ODMEREK                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                               | Scala                          | 0,375 L/višinski m krošnje/ha, (max. 1,125 L/ha) | 56 dni 4xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        |                               | Avalon                         | 1,125 L/ha                                       | 56 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        |                               | Erune 40 SC                    | 1,125 L/ha                                       | 56 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        |                               | Pretil                         | 1,125 L/ha                                       | 56 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        |                               | Mythos <b>se ne trži</b>       | 1,5 L/ha                                         | 56 dni 4xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        | ditianon                      | Delan 700 WG                   | 0,75 kg/ha                                       | 42 dni 6xL                | <p>- v odmerku 0,75 kg/ha, v 7 dnevnem razmiku, od BBCH 57-72.</p> <p>- v odmerku 0,5 kg/ha, v 5 dnevnem razmiku od (BBCH 73-79).</p> <p>Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.</p> |
|                     |        | ditianon + kalijeve fosfonati | Alcoban                        | 0,75 kg/ha                                       | 42 dni 3xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        |                               | Delan pro                      | 2,5 L/ha                                         | 35 dni 6xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        | ditianon + pirimetanil        | Faban                          | 1,2 L/ha                                         | 56 dni 4xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |        | ditianon + ciprodinil         | Chorus forte <b>se ne trži</b> | 2,0 L/10.000 m <sup>2</sup> listne površine      | 35 dni 2xL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO       | ODMEREK                                                        | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                                                |                                 | max. 3,6 L/ha                                                  |                           |                                                                                                                 |
|                     |        | folpet + difenokonazol                         | Difol                           | 3,5 L/ha                                                       | 110 dni 3xL               |                                                                                                                 |
|                     |        | kaptan                                         | Merpan 80 WDG                   | 1,88 kg/ha                                                     | 28 dni 10xL               |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Captan 80 WG                    | 2,0 kg/ha                                                      | 28 dni 10xL               |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Orthocide 80 WG                 | 2,0 kg/ha                                                      | 28 dni 10xL               |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Scab 80 WG                      | max.1,9 kg/ha oz. 0,63 kg/ha na 1 m višine krošnje             | 21 dni 10xL               |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Scab 480 SC                     | 3,13 L/ha                                                      | 21 dni 10xL               |                                                                                                                 |
|                     |        | kaptan + kalijeve fosfonate                    | Merplus <b>se ne trži</b>       | 2 L/ha                                                         | 28 dni 8xL                |                                                                                                                 |
|                     |        | difenokonazol (triazol)                        | Score 250 EC                    | 0,2 L/ha                                                       | 21 dni 3x L               | Sistemične pripravke na osnovi triazolov, strobilurinov in SDHI pripravke vedno mešamo z dotikalnimi fungicidi. |
|                     |        |                                                | Mavita 250 EC <b>se ne trži</b> | 0,2 L/ha                                                       | 21 dni 3x L               |                                                                                                                 |
|                     |        |                                                | Duaxo koncentrat                | max. 3,3 L/ha                                                  | 14 dni 3xL                |                                                                                                                 |
|                     |        | mefentriflukonazol (triazol)                   | Revyona                         | 1,3 L/10.000 m <sup>2</sup> površine listne stene (max. 2L/ha) | 28 dni 2xL                |                                                                                                                 |
|                     |        | difenokonazol+ fluksapiroksat (triazol + SDHI) | Sercadis plus                   | 1,2 L/ha                                                       | 35 dni 2xL                |                                                                                                                 |
|                     |        | fluksapiroksad (SDHI)                          | Sercadis                        | 0,25-0,3 L/ha                                                  | 35 dni 3xL                | Uporaba: za zmanjšanje okužb h. škrlupa                                                                         |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | krezoksim-metil (strobilurin) | Stroby WG <b>se ne trži</b> | 0,2 kg/ha                                     | 28 dni 4xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        | boskalid +piraklostrobin      | Bellis <b>se ne trži</b>    | 0,8 kg/ha                                     | 7 dni 3xL                 | <b>Zaloge v uporabi do: 31.1.2025</b>                                                                                                                             |
|                     |        | fluopiram + fosetil - Al      | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1kg/1meter višine krošnje/ha (max. 3,0 kg/ha) | 28 dni 3xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        | kalijev hidrogen karbonat     | Karbicare                   | 5 kg/ha                                       | 1 dan 5xL                 | Uporaba: za zmanjševanje okužb h. škrlupa                                                                                                                         |
|                     |        |                               | Vitisan                     | 2,5 kg/meter višine krošnje max. 7,5 kg/ha    | 1 dan 6xL                 |                                                                                                                                                                   |
|                     |        | žveplo                        | Cosan                       | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                | Uporaba: zmanjšanje okužb hruševega škrlupa.<br>Vsi pripravki na osnovi žvepla imajo stranski akaricdni učinek in delujejo tako na škodljive kot koristne pršice. |
|                     |        |                               | Kumulus DF                  | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Microthiol disperss         | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Microthiol special          | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Pepelin                     | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Thiovit Jet                 | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Vindex 80 WG                | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Sulfar                      | 5 – 8 kg/ha                                   | 7 dni 14xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        |                               | Vertipin                    | 7 L/ha                                        | 3 dni 12xL                |                                                                                                                                                                   |
|                     |        | fludioksonil                  | Geoxe                       | max. 0,45 kg/ha                               | 3 dni 2xL                 |                                                                                                                                                                   |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                          | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|
| <b>Rjava (stempilijska) gniloba plodov hrušk</b><br><i>Stemphylium sp.</i><br><i>Pleospora sp.</i><br><br><b>Siva plesen</b><br><i>(Botryotinia fuckeliana)</i><br><br><b>Grenka gniloba</b><br><i>(Gloeosporium spp.)</i> | Ugodne pogoje za okužbe ustvarja vroče in deževno vreme in vsi dejavniki, ki povzročajo poškodbe plodov.<br><br><b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na glivo delno delujejo FFS, ki jih uporabljamo za zatiranje sadne gnilobe.</li> </ul> | ciprodinil + fludioksonil                                            | Switch 62,5 WG              | 0,08 % (max. 1 kg/ha)                         | 3 dni 3xL                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pirimetanil + fludioksonil                                           | Pomax                       | 1,6 L/ha                                      | 5 dni 2xL                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fluopiram + tebukonazol                                              | Luna experience             | 0,25 L/1m višine krošnje/ha (max. 0,75 L/ha)  | 14 dni 2xL                |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fluopiram + fosetil - Al                                             | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1 kg/meter višine krošnje/ha (max. 3,0 kg/ha) | 28 dni 3xL                |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pirimetanil                                                          | Scala                       | 1,5 L/ha                                      | 56 dni 4xL                |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | boskalid +piraklostrobin                                             | Bellis <b>se ne trži</b>    | 0,8 kg/ha                                     | 7 dni 3xL                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo – X                   | 1,5 – 2,5 kg/ha                               | 6xL                       |        |
| <b>Navadna sadna gniloba</b><br><i>(Monilinia fructigena)</i>                                                                                                                                                              | Higieniski ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani. Le za gnitje so hruške bolj občutljive kot jabolka.                                                                                                                                                       | fluopiram + tebukonazol                                              | Luna experience             | 0,25 L/1m višine krošnje/ha (max. 0,75 L/ha)  | 14 dni 2xL                |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pirimetanil                                                          | Scala                       | 1,5 L/ha                                      | 56 dni 4xL                |        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pirimetanil + fludioksonil                                           | Pomax                       | 1,6 L/ha                                      | 5 dni 2xL                 |        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                       | KARENCA dovoljeno št. rab  | OPOMBE                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo – X                   | 1,5 – 2,5 kg/ha                               | karenca ni potrebna; 6 x L |                                                       |
| <b>Gniloba koreninskega vratu</b> ( <i>Phytophthora cactorum</i> ) | Agrotehnični ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cu oksiklorid                                                        | Cuprblau Z 35 WG            | 15 – 35 g / 100 L vode                        | ČU; 1xL                    | Za uporabo na posamičnih drevesih, za manjše uporabe. |
| <b>Jablanov rak</b> ( <i>Nectria galligena</i> )                   | Ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cu oksid                                                             | Nordox 75 WG                | 1,6 kg/ha                                     | ČU; 3xL                    |                                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fluopiram + tebukonazol                                              | Luna experience             | 0,25 L/1m višine krošnje/ha<br>max. 0,75 L/ha | 14 dni 2xL                 |                                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fluopiram + fosetil - Al                                             | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1kg/meter višine krošnje/ha (max. 3,0 kg/ha)  | 28 dni 3xL                 |                                                       |
| <b>Hruševa rja</b> ( <i>Gymnosporangium sabinae</i> )              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osnovni dejavnik, ki odloča o obsegu okužb je bližina nekaterih vrst okrasnih brinov, ki so osnovni gostitelji hruševe rje.</li> </ul> <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V intenzivnih nasadih v času okužb proti škrlupu uporabimo fungicide, ki so učinkoviti tudi proti tej glivi, zato ločeno zatiranje ni potrebno.</li> </ul> | difenkonazol                                                         | Duaxo koncentrat            | max. 3,3L/ha                                  | 14 dni 3xL                 |                                                       |
| <b>Hrušev ožig</b> ( <i>Erwinia amylovora</i> )                    | Glej besedilo pri jablani.<br>Sadjarji se naj poslužujejo strokovnih navodil za ukrepanje, ki so na <a href="#">spletni strani UVHVVR</a> ter na FITO INFO spletni strani, kjer so objavljene napovedi nevarnosti okužb javne službe za varstvo rastlin. V času po cvetenju je treba v skladu z napovedmi nevarnosti okužb redno pregledovati sadovnjake.                                                         |                                                                      |                             |                                               |                            |                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                          | UKREPI                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO   | ODMEREK                                                     | KARENCA dovoljeno št. rab               | OPOMBE                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani.                                                    | Cu hidroksid + Cu oksiklorid                                         | Badge WG                    | 2,9 kg/ha                                                   | ČU 2xL                                  |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | Cu hidroksid                                                         | Kocide 2000                 | 2 kg/ha                                                     | ČU 3xL                                  |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | Cu oksiklorid                                                        | Cuprablau Z 35 WP           | 0,48 - 2,5 kg/ha                                            | ČU 3x do konca cvetenja, 5x po cvetenju |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               |                                                                      | Cuprablau Z 35 WG           | 0,27 - 2,5 kg/ha                                            | ČU 4xL                                  |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | Cu oksid                                                             | Nordox 75 WG                | 1- 1,6 kg/ha od BBCH 00 do 53;<br>0,3 kg/ha od BBCH 57 - 69 | ČU 3xL                                  |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | fosetil-Al                                                           | Aliette flash               | 3,75 kg/ha                                                  | 28 dni 3xL                              |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | fluopiram + fosetil - Al                                             | Luna Care <b>se ne trži</b> | 1 kg/meter višine krošnje/ha (max. 3,0 kg/ha)               | 28 dni 3xL                              |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST 713                            | Serenade ASO                | 8 L/ha                                                      | 6 x L                                   |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo – X                   | 1,5 – 2,5 kg/ha                                             | 6 x L                                   |                                                                                     |
| <b>Navadna hruševa bolšica</b><br>( <i>Cacopsylla pyri</i> ) | Bolšice iz rodu <i>Cacopsylla</i> so pomembni prenašalci fitoplazem.<br><br><b>Neposredne metode varstva:</b> | acetamiprid                                                          | Mospilan 20 SG              | 0,05%                                                       | 14 dni 2xL                              | Pripravke kombiniramo z oljnimi pripravki. Med rastno dobo naj koncentracija le teh |
|                                                              |                                                                                                               | lambda-cihalotrin                                                    | Karate zeon 5 CS            | 0,018%                                                      | 14 dni 2xL                              |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | spinetoram                                                           | Delegate 250 WG             | 0,3 kg/ha                                                   | 7 dni 1x L                              |                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                               | spirotetramat                                                        | Movento 100 SC              | 1,9 L/ha                                                    | 21 dni 2xL                              |                                                                                     |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                       | KARENCA dovoljeno št. rab                 | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistematično zatiranje navadne hruševe bolšice je smiselno v nasadih, kjer se opaža povečan pojav bolezní odmíranje hrušk (pear decline), ki jo povzroča fitoplazma '<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>'. Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO) za sadilni in razmnoževalni material hruške (<i>Pyrus</i>)</li> <li>Pred brstenjem je zatiranje bolšice upravičeno v nasadih, kjer je več kot 3 % dreves okuženih s to fitoplazmo. Nevarnost, da prizadenemo naravne sovražnike je v tem času majhna. Dovoljeno je uporabiti insekticide, ki imajo delovanje na bolšice in se smejo uporabiti na hruški.</li> <li><u>Prag škodljivosti: v obdobju pred in takoj po cvetenju: 10% napadenih cvetnih šopov; kasneje: več kot 15 poganjkov od 100 preglednih, napadenih z nimfami prvega in drugega stadija.</u></li> <li>Pomembno je, da se uspešno ustavi razvoj prve generacije, proti kateri ukrepamo ob preseženem pragu škodljivosti.</li> <li>Pozneje se regulacijo prepusti plenilskim stenicam (npr. rodu <i>Anthocoris</i>) in drugim naravnim sovražnikom.</li> </ul> | piriproksifen                              | Harpun                    | 0,0375-0,05 % oz. do 0,5 L/ha | Zaloge v uporabi do: 30.10.2025<br>ČU 2xL | ne preseže 0,25 – 0,35%. Dodajamo lahko tudi močila.V nasadih, kjer se opazi prisotnost karantenske fitoplazme Pear decline (odmíranje hrušk – obvestiti UVHVVR), je smiselno v sodelovanju z Javno službo ZVR za zatiranje navadne hruševe bolšice oblikovati posebno strategijo. Dovoljena je uporaba pripravka na osnovi piretrina. Tretíranje v času pred in med brstenjem. |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piretrin                                   | Asset Five                | 0,96 L/ha                     | ČU 2XL                                    | Delno zatíranje bolšíc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | parafinsko olje                            | Ovitex                    | 20L/ha ali 2x10 L/ha          | ČU 1-2XL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Beauveria bassiana</i> , sev ATCC 74040 | Naturalis                 | 1,5 L/ha                      | ni potrebna 5xL                           | Delno zatíranje bošíc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                             | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                  | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Biotično varstvo: možnost vnosa <i>Anthocoris nemoralis</i> – cvetna stenica oz. njenega komercialnega produkta</li> <li>Čas in izbor pripravkov za zatiranje drugih škodljivcev mora biti prilagojen bolšici in njenim naravnim sovražnikom.</li> <li>K zmanjševanju populacije bolšic se pripomore tudi z odstranjevanjem koreninskih izrastkov in zatiranjem plevelov.</li> <li>V jesenskem obdobju, ko so bolezenski znaki jasno vidni, je treba drevesa odstraniti skupaj s koreninami.</li> </ul> |              |                           |                          |                           |                                                  |
| <b>Velika hruševa bolšica</b><br>( <i>Cacopsylla pyrisuga</i> ) | <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Načrtno zatiranje je potrebno zgolj v mladih nasadih.</li> <li>Lahko se pojavi nekoliko pozneje od navadne h. bolšice, zato je pri zgodnjih škropljenjih ne zatrema popolnoma.</li> <li><u>Prag škodljivosti: več kot 15 poganjkov od 100 preglednih, napadenih z nimfami prvega in drugega stadija.</u></li> <li>Ob preseganju praga škodljivosti se v mesecu maju uporabi enake pripravke kot za zatiranje navadne hruševe bolšice.</li> </ul>                      |              |                           |                          |                           | Zatiranje enako kot pri navadni hruševi bolšici. |
| <b>Hruševa grizlica</b><br>( <i>Hoplocampa brevis</i> )         | Agrotehnični ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | acetamiprid  | Mospilan 20 SG            | 0,04%<br>(max.0,4 kg/ha) | 14 dni 2xL                |                                                  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UKREPI                                                                                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV                                                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                           | KARENCA dovoljeno št. rab              | OPOMBE                       |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Listne uši na hruškah</b><br><br>Mokasta hruševa uš ( <i>Dysaphis piri</i> )<br><br>Rjava hruševa uš ( <i>Melanaphis pyrae</i> )<br><br>Hrušev uš šiškarica ( <i>Anuraphis farfare</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uši v nasadih hrušk predstavljajo stalne, vendar ne posebej problematične škodljivce. Njihove populacije se povečajo, kadar za zatiranje zavijačev in bolšic uporabljamo le inhibitorje razvoja insektov. | acetamiprid                                                                    | Mospilan 20 SG            | 0,025 - 0,04%<br>0,25 - 0,4 kg/ha | 14 dni 2xL                             |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | flonikamid                                                                     | Teppeki Afinto            | 0,14 kg/ha                        | 21 dni 3xL                             |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | flupiradifuron                                                                 | Sivanto prime             | 0,4 L/ha                          | 14 dni 1x L                            |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | spirotetramat                                                                  | Movento 100 SC            | 1,9 L/ha                          | 21 dni 2xL                             |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   | <b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | piretrin                                                                       | Asset Five                | 0,96 L/ha                         | ČU 2XL                                 | Delno zatiranje listnih uši. |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | parafinsko olje                                                                | Ovitex                    | 20 L/ha                           | ČU 1XL                                 |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | olje navadne ogrščice                                                                                                                                                                                     | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okr. Rast.-koncentrat | 2 - 3 %                   | ni potrebna 3xL                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Varovalno biotično varstvo: vzdrževanje ekoloških niš, setev privabilnih rastlin in izmenično mulčenje v medvrstnem prostoru, kar daje zavetje in hrano koristnim organizmom (muhe trepetalke, parazitske osice, tančičarice, plenilske stenice, polonice...).</li><li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije listnih uši:<ul style="list-style-type: none"><li>Pregledi poganjkov</li></ul></li></ul> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| Preglednica: Pragovi škodljivosti za listne uši                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| <table><tr><th colspan="2">Prag škodljivosti na 100 pregledanih poganjkov</th></tr><tr><td>Hruševa mokasta uš</td><td>1 do 2 koloniji</td></tr><tr><td>Rjava hruševa uš</td><td>4 do 8 kolonij</td></tr><tr><td>Hruševa uš šiškarica</td><td>več kot 20 napadenih listov na 100 naključno izbranih listov</td></tr></table>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              | Prag škodljivosti na 100 pregledanih poganjkov |  | Hruševa mokasta uš | 1 do 2 koloniji | Rjava hruševa uš | 4 do 8 kolonij | Hruševa uš šiškarica | več kot 20 napadenih listov na 100 naključno izbranih listov |
| Prag škodljivosti na 100 pregledanih poganjkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| Hruševa mokasta uš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 do 2 koloniji                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| Rjava hruševa uš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 do 8 kolonij                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| Hruševa uš šiškarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | več kot 20 napadenih listov na 100 naključno izbranih listov                                                                                                                                              |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |
| Ob preseganju praga škodljivosti uporaba kemičnih FFS - insekticidov registriranih za zatiranje listnih uši                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                   |                                        |                              |                                                |  |                    |                 |                  |                |                      |                                                              |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIVNA SNOV                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hrušev zavijač</b><br>( <i>Cydia pyrivora</i> )<br><br><b>Jabolčni zavijač</b><br>( <i>Cydia pomonella</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Pri zatiranju skušamo zatreti oba zavijača hkrati.</li><li>Neposredne metode varstva enke kot pri zatiranju jabolčnega zavijača pri jablani. Število škropljenj je odvisno od ocene jakosti napada jabolčnega zvijača. Za zatiranje hruševega zavijača bi potrebovali le dve škropljenji.</li><li>Ločenih škropljenj za zatiranje zavijačev lupine sadja pri hruškah se ne izvaja.</li></ul> | klorantraniliprol                                    | Coragen                   | max 0,27 L/ha                 | 14 dni 2xL                | Večina pripravkov, ki so registrirani za jabolčnega zavijača sočasno deluje tudi na hruševega zavijača. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Voliam                    | 18 mL/hL - 270 mL/ha          |                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Shenzo 200 SC             |                               |                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | spinetoram                                           | Delegate 250 WG           | 0,3 kg/ha                     | 7 dni 1x L                |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | acetamiprid                                          | Mospilan 20 SG            | 0,04% (max. 0,4 kg/ha)        | 14 dni 2xL                |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | emamektin                                            | Affirm opti               | 2,0 kg/ha                     | 7 dni 3xL                 |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ciantraniliprol                                      | Exirel                    | 50 – 60 mL/hL (max. 0,9 L/ha) | 7 dni 2 xL                | za zamnjšanje populacije jabolčnega zavijača                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | spinosad                                             | Laser plus                | 0,3 L/ha                      | 7 dni 1xL                 |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | virus granuloze                                      | Madex max                 | 50 mL/ha/1meter krošnje       | ni potrebna 10XL          |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kodlemon                                             | Rak 3                     | 500 dis./ha                   | ni potrebna               |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SemiosNET-Codling Moth                               | 2- 2,5 razpršilnika/ha    | ni potrebna                   |                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Checkmate puffer CM - PRO                            | 2 – 3 enote/ha            | ni potrebna                   |                           |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Hrušev brstožer</b><br>( <i>Anthonomus piri</i> ) |                           |                               |                           |                                                                                                         |
| <b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izrezovanje in odstranjevanje vejic z napadenimi brsti preden ličinka zaključi razvoj.</li><li>V večini primerov zatiranje tega škodljivca ni potrebno. Zatira se ga le izjemoma, če se pojavi močan napad več let zapored.</li><li>Spremljanja razvoja in številčnosti populacije škodljivca<ul style="list-style-type: none"><li>Pregledi brstov: Prag škodljivosti: po obiranju hrušk vbodi samic na več kot 30% brstih oz. po odlaganju jajčec</li></ul></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                           |                               |                           |                                                                                                         |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                   | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                    | KARENCA dovoljeno št. rab                         | OPOMBE |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
|                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ob preseganju praga škodljivosti uporaba insekticidov registriranih za zatiranje jablanovega cvetožerja. Aplikacija je potrebna le v vrstah, ki so oddaljene 30 do 50 m od gozda.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                            |                                                   |        |
| Hruševa listna hrčica<br>( <i>Dasineura pyri</i> )    | Največ škode povzroča na mladih drevesih, ker zastoj rasti poganjkov otežuje oblikovanje rodnega volumna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | spirotetramat   | Movento 100 SC            | 1,9 L/ha                                   | 21 dni 2xL<br><br>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025 |        |
|                                                       | <b>Agrotehnični ukrep:</b> S plitvim obdelovanjem tal pod drevesi spomladi delno prizadenemo bube, ki prezimijo v tleh.<br><b>Neposredne metode varstva:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Med rastno dobo se redno izrezuje močno napadene poganjke in se jih odstrani iz nasada.</li><li>Posebej se je ne zatira. Pripravek na osnovi spirotetramata, ki se ga uporabi po cvetenju za zatiranje bolšic in uši, je registriran tudi za zatiranje listnih hrčic na hruški. Prva tako imajo stranski učinek tudi pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje grizlice.</li></ul> |                 |                           |                                            |                                                   |        |
| Hruševa hrčica<br>( <i>Contarinia pyrivora</i> )      | <b>Agrotehnični ukrep:</b><br><br>S plitvim obdelovanjem tal pod drevesi se spomladi delno prizadene bube, ki prezimijo v tleh.<br><b>Neposredne metode varstva:</b><br><br>Zatiranje enako kot pri hruševi listni hrčici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                           |                                            |                                                   |        |
| Rdeča sadna pršica<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )      | Posredni-preventivni ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani.<br><br>Hruševe rjaste pršice in hruševe pršice šiškarice se posebej ne zatira, posredno se nanje vpliva ob zatiranju drugih vrst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | parafinsko olje | Belo olje Karsia          | 10 L/ha na m višine krošnje (max. 30 L/ha) | ČU 1XL                                            |        |
| Hruševa rjasta pršica<br>( <i>Epirimerus pyri</i> )   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Frutapon                  | 10 L/ha na m višine krošnje (max. 30 L/ha) | ČU 1XL                                            |        |
| Hruševa pršica šiškarica<br>( <i>Eriophyes pyri</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Ovitex                    | 20 L/ha                                    | ČU 1XL                                            |        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                        | UKREPI                                           | AKTIVNA SNOV                       | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                                      | ODMEREK                      | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                  | olje navadne ogrščice              | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okr. Rast.-koncentrat | 2 - 3 %                      | ni potrebna 3 x L         |                                                                    |
|                                            |                                                  | klofentezin                        | Apollo 50 SC                                                                   | 0,4 L/ha                     | 35 dni 1xL                | Zaloge v uporabi do: 11.11.2024                                    |
|                                            |                                                  | acekvinocil                        | Kanemite SC                                                                    | 0,625 L/ha/m                 | 14 dni 1XL                |                                                                    |
|                                            |                                                  | heksitiazoks                       | Nissorun 10 WP                                                                 | 0,33kg/ha/m (max.1,0 kg/ha)  | 28 dni 1xL                |                                                                    |
|                                            |                                                  |                                    | Nissorun 250 SC se ne trži                                                     | 0,13L/ha/m, (max. 0,39 L/ha) | 28 dni 1xL                |                                                                    |
|                                            |                                                  | tebufenpirad                       | Shirudo (staro ime Masai)                                                      | 0,5 kg/ha                    | 7 dni 1xL                 |                                                                    |
|                                            |                                                  | milbemektin                        | Milbeknock                                                                     | 0,625 l/ha/m                 | 14 dni 2xL                |                                                                    |
|                                            |                                                  | Beauveria bassiana, sev ATCC 74040 | Naturalis                                                                      | 1,5 L/ha                     | ni potrebna               |                                                                    |
| Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) | Neposredne metode varstva enake kot pri jablani. | acetamiprid                        | Mospilan 20 SG                                                                 | 0,05% (max. 0,5 kg/ha)       | 14 dni 2xL                |                                                                    |
|                                            |                                                  | deltametrin                        | Decis 2,5 EC                                                                   | 0,5 L/ha                     | 7 dni 2xL                 |                                                                    |
|                                            |                                                  |                                    | Decis 100 EC                                                                   | 0,75 mL/ha                   | 7 dni 1xL                 |                                                                    |
|                                            |                                                  | lambda-cihalotrin                  | Karate zeon 5 CS                                                               | 0,018%                       | 14 dni 2xL                |                                                                    |
|                                            |                                                  | piretrin                           | Asset Five                                                                     | 0,96 L/ha                    | ČU 2XL                    | Delno zmanjševanje številčnosti populacije marmorirane smrdljivke. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                 | UKREPI                                                                          | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ameriški kapar</b><br><i>(Quadriaspidiotus perniciosus)</i><br><br><b>Vejičasti kapar</b><br><i>(Lepidosaphes ulmi)</i><br><br><b>Hrušev rdeči kapar</b><br><i>(Epidaspis leperii)</i><br><br><b>Ostrigasti kapar</b><br><i>(Quadriaspidiotus ostreaeformis)</i> | Posredni-preventivni ukrepi in neposredne metode varstva enake kot pri jablani. |              |                           |         |                           | Za zatiranje kaparjev v hruški, uporabimo enake pripravke kot pri jablani.                                    |
| <b>Hrušev brstožer</b><br><i>(Anthonomus piri)</i>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |              |                           |         |                           | Pripravki, ki so registrirani za zatiranje jablanovega cvetožera imajo delovanje tudi na hruševega brstožera. |

### 11.3 INTEGRIRANO VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                    | UKREPI                                                                                                                                | AKTIVNA SNOV      | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Listna luknjičavost koščičarjev</b><br><i>(Stigmina carpophila)</i> | Z jesenskimi oziroma predpomladanskimi škropljenji proti breskovi kodravosti se običajno zatira tudi listno luknjičavost koščičarjev. | bakrov oksiklorid | Cuprablau Z 35 WP         | 2 kg/ha | ČU 3XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIVNA SNOV                                                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                         | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>Sredstvo na osnovi aktivne snovi ditianon se lahko uporablja samo v času od končanega obiranja do konca mirovanja. Sredstvo na osnovi aktivne snovi fluopiram + tebukonazol se lahko uporabi 2x letno</p> <p><b><u>Kemično zatiranje:</u></b><br/>         Proti luknjičavost koščičarjev se lahko škropi že jeseni takoj po odpadanju listja ali pa pozimi (spomladi) v fenološki fazi B-C s pripravki na osnovi bakra. Sredstvo na osnovi aktivne snovi ditianon se lahko uporablja samo v času od končanega obiranja do konca mirovanja.</p> | bakrov oksiklorid                                                          | Cuprblau Z 35 WG          | 1,6-2 kg/ha                                     | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | baker v obliki bakrovega hidroksida + baker v obliki bakrovega oksiklorida | Badge WG                  | 3,5 kg/ha                                       | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ditianon                                                                   | Delan 700 WG              | 0,75 kg/ha                                      | ČU 2XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fluopiram + tebukonazol                                                    | Luna experience           | max 0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha) | 7 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kaptan                                                                     | Orthocide 80 WG           | 1,8 kg/ha                                       | 21 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK   | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breskova kodravost</b><br>( <i>Taphrina deformans</i> ) | <p>Pojav bolezni še ni mogoče zanesljivo napovedovati, zato proti njej se škropi preventivno. Prvič se lahko škropi že jeseni, takoj po odpadanju listja, drugič pa proti koncu februarja ali v začetku marca, ko se brsti že napnejo. Obdobje občutljivosti breskev in nektarin na breskovo kodravost lahko traja tudi do 6 tednov po začetku brstenja. Ta čas je odvisen predvsem od temperature in s tem hitrosti odganjanja breskev.</p> <p>Če je v času brstenja vreme deževno, je priporočljivo škropiti še tretjič v fazi tik pred cvetenjem. V tej fazi se lahko uporablja samo še organske fungicide.</p> | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WP         | 3,0 kg/ha | 21 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bakrov oksid                         | Nordox 75 WG              | 2,0 kg/ha | ČU                        | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dodin                                | Syllit 400 SC             | 2,25 L/ha | 75 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dodin                                | Syllit 544 SC             | 1,65 L/ha | 75 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breskov škrlup</b><br>( <i>Venturia carpophila</i> )                           | <p>Breskov škrlup je predvsem bolezen breskev na vlažnejših legah v dolinah. Močno okuženi plodovi so neprimerni za svežo prodajo, kakor tudi za predelavo. Škodo povzroča pri srednje poznih in predvsem poznih sortah breskev. Na zračnih in dvignjenih legah se bolezen običajno ne pojavlja in jo zato ni potrebno zatirati. Take lege so manj primerne za pozne sorte breskev, ker poleti primanjkuje vlage.</p> <p><b><u>Tehnološki ukrepi:</u></b><br/>Poskrbeti je treba za zračnost krošnje, zato je odstranjevanje odvečnih bohotivk bistvenega pomena za manjši pojav bolezni.</p> | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha   | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |
| <b>Breskova pepelovka</b><br>( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> ) | <p><b><u>Tehnološki ukrepi:</u></b><br/>Poskrbeti je treba za zračnost krošnje, zato je odstranjevanje odvečnih bohotivk bistvenega pomena za manjši pojav bolezni in tudi za kakovost varstva s fungicidi. Poskrbeti je treba za uravnoteženo gnojenje z dušikom. Kemično zatiranje: H kemičnemu zatiranju se zateče šele, ko se pojavijo prvi simptomi bolezni. Preventivno se škropi le zelo občutljive sorte breskev in predvsem nektarink in sicer prvič, ko se breskve slačijo in se ga ponavlja v 12-14 dnevni presledkih.</p>                                                         | močljivo žveplo                      | Azumo WG                  | 7,5 kg/ha     | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Biotip Sulfo 800 SC       | 6 L/ha        | 14 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Thiovit jet               | 5,0-7,5 kg/ha | 21 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Cosan                     | 5,0-7,5 kg/ha | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                                 |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|---------------------|--------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |              |                           |               |                           | brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                                                    |
|                     |        |              | Kumulus DF                | 5,0-7,5 kg/ha | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |        |              | Microthiol Disperss       | 5,0-7,5 kg/ha | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |        |              | Microthiol Special        | 5,0-7,5 kg/ha | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |        |              | Pepelin                   | 5,0-7,5 kg/ha | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |        |              | Sulfar                    | 5,0-7,5 kg/ha | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |        |              | Vertipin                  | 5 L/ha        | 3 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                                 |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK               | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                             |
|---------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                |                           |                       |                           | brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                                                                    |
|                     |        |                | Vindex                    | 5,0-7,5 kg/ha         | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda                 |
|                     |        |                | Pol-Sulphur 800 SC        | 6 L/ha                | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                        |
|                     |        | COS-OGA        | Fytosave                  | 2 L/ha                | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od meje brega voda 2. reda |
|                     |        | difenokonazol  | Score 250 EC              | 0,03% (max 0,45 L/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                        |
|                     |        |                | Mavita 250 EC             | 0,03% (max 0,45 L/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                        |
|                     |        | fluksapiroksad | Sercadis                  | 0,15 L/ha             | 21 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne                                                                  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                          | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                            | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                                                    |                           | površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                              |
| Cvetna monilija<br>( <i>Monilinia laxa</i> ) | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br/>Občutljive sorte breskev in posebej nektarin se ne sadi na vlažne in zaprte lege. Poskrbeti je treba za usklajeno gnojenje z dušikom. Odstranjuje se okužene poganjke in se jih odstrani iz nasada. Pri zimski rezi se odstrani vse mumije plodov iz prejšnje sezone.</p> <p><b><u>Kemično zatiranje:</u></b><br/>Breskve in nektarine (samo občutljive sorte) v cvet se tretira največ enkrat z enim od navedenih pripravkov proti koncu cvetenja, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.</p> | fluopiram + tebukonazol  | Luna experience           | max 0,6 L/ha<br>(0,2 L na 1m višine krošnje na ha) | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fenpirazamin             | Prolectus                 | 330 g na 1m višine krošnje na ha<br>(max 1 kg/ha)  | 1 dan                     | Največ 3 krat v eni rastni sezoni. Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 10 m od 2. reda |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mefentriflukonazol       | Revyona                   | 1,8 L/ha                                           | 3 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | boskalid+ piraklostrobin | Signum                    | 0,25 kg/ha/m višine krošnje<br>(max 0,75 kg/ha)    | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | izofetamid               | Zenby                     | 0,9 L/ha                                           | ČU 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                     | UKREPI                                                                                                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV                                                  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                    | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | baker v obliki bakrovega oksiklorida                          | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha                | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | <i>Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum</i> , sev D747 | Amylo-X                   | 1,5 – 2,5 kg/ha            | ni potrebna 6XL           | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid                          | Badge WG                  | 3,5 kg/ha                  | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | ciprodinil                                                    | Chorus 50 WG              | 0,5 kg/ha                  | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.         |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | ciprodinil + fludioksonil                                     | Switch 62,5 WG            | 0,08 % (max 1kg/ha)        | 14 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |
| <b>Sadna gniloba</b><br>( <i>Monilinia fructigena</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>Poleg ukrepov, ki so navedeni pri cvetni moniliji, se poskrbi za zračnost drevesne krošnje, tako da se odstranjuje odvečne poganjke in bohotivke. Obvezno je odstranjevanje vseh posušenih | ciprodinil                                                    | Chorus 50 WG              | 0,6 kg/ha                  | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.         |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | fluopiram + tebukonazol                                       | Luna experience           | max 0,6 l/ha (0,2 l na 1 m | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni                                                               |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                    | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>plodov (mumij) z dreves. Kolikor je mogoče je treba preprečevati nastanek poškodb na plodovih.</p> <p><b>Kemično zatiranje:</b><br/> Sorte breskev in nektarin se lahko škropi od 3 do 4 tedne pred obiranjem in 1 teden oz. 3 dni pred obiranjem z enim izmed navedenih pripravkov glede na predpisano karenčno dobo.</p> |                                             |                           | višine krošnje na ha)                                                      |                           | pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | difenokonazol                               | Mavita 250 EC             | 0,03% (max 0,45 l/ha)                                                      | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | difenokonazol                               | Score 250 EC              | 0,03% (max 0,45 l/ha)                                                      | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ciprodinil + fludioksonil                   | Switch 62,5 WG            | 0,08 % (max 1 kg/ha)                                                       | 14 2xL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br><br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda;<br>Zmanjševanje okužb.<br>Tudi za sivo plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> ) |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fenheksamid                                 | Teldor SC 500             | 1 L/ha                                                                     | 3 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni                                                                                                                                                                                   |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                            | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|---------------------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                           |                           |                                                    |                           | pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                 |
|                     |        | kalijev hidrogen karbonat | Karbicure                 | 5 kg/ha                                            | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                     |        | fenheksamid               | Libreto                   | 1 L/ha                                             | 3 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                     |        | fenpirazamin              | Prolectus                 | 400g na 1m višine krošnje na ha (max. 1,2 kg/ha)   | 1 dan                     | Največ 3 krat v eni rastni sezoni. Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 10 m od 2. reda |
|                     |        | mefentriflukonazol        | Revyona                   | 1,8 L/ha                                           | 3 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                     |        | boskalid+piraklostrobin   | Signum                    | 0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje (max. 0,75 kg/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                                                                     |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK               | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                           |                       |                           | brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bakrov oksiklorid                                         | Cuprblau Z 35 WG          | 1,6-2 kg/ha           | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha         | ni potrebna 6XL           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid                      | Badge WG                  | 3,5 kg/ha             | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
| <b>Plodova monilija</b><br><i>(Monilinia fructicola)</i><br><br>Napada vse koščičarje, najpogostejša je na breskvah in nektarinah. | Plodova monilija povzroča propadanje cvetov, listov in poganjkov ter gnitje plodov. Cvetovi in listi porjavijo in ne odpadejo takoj, na okuženih poganjkih se pojavijo rjave uleknjene nekroze in razjede, iz katerih se pri koščičarjih izloča smolika. Vrhovi poganjkov se sušijo, propadejo lahko tudi večje veje. Gnili plodovi se jasneje posušijo in zgubajo, nastanejo mumije. Bolezen | ciprodinil                                                | Chorus 50 WG              | 0,6 kg/ha             | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                             |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ciprodinil + fludioksonil                                 | Switch 62,5 WG            | 0,08 %, (max 1 kg/ha) | 14 dni 2xL                | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AKTIVNA SNOV                                       | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                    | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>lahko povzroči zelo veliko gospodarsko škodo zaradi gnitja plodov v nasadu pred obiranjem ter kasneje v skladišču. Simptomi in prav tako škoda so enaki kot pri navadni sadni gnilobi ali cvetni moniliji, za določitev plodove monilije je zato potrebna laboratorijska analiza.</p> <p>Za preprečevanje gospodarske škode je pomembno izvajanje agrotehničnih, kemičnih, higienskih in drugih ukrepov.</p> <p><b>Higienski ukrepi</b> so zlasti: odstranjevanje mumij ter okuženih poganjkov in vej, ki jih je potrebno odstraniti iz nasada ter zažgati ali globoko zakopati; vzdrževanje zračne krošnje, higiena in razkuževanje skladišč za plodove ter embalaže, orodja in naprav predvsem v času obiranja ter pred naslednjo sezono.</p> <p><b>Drugi ukrepi:</b> Pomembna je tudi optimalna preskrbljenost rastlin s hranili in vodo, izogiba se premočnemu gnojenju z dušikom. Sadi se le neokužen sadilni material, opremljen z rastlinskim potnim listom.</p> <p>Uporaba <b>kemičnih sredstev</b> je nujno potrebna. Pri tem je potrebno upoštevati, da je boljše učinkovito tretiranje z veliko porabo vode ob koncu in začetku rastne dobe. Velika poraba vode je potrebna tudi</p> | <i>Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum</i> | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha                                                              | ni potrebna 6XL           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. S sredstvom se na isti površini v eni rastni dobi škropi največ 6 krat.   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kalijev hidrogen karbonat                          | Karbicare                 | 5 kg/ha                                                                    | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24        | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br><br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; Zmanjševanje okužb. Tudi za sivo plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> ) |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK    | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | <p>kasneje pri varstvu plodov (1000-2000 l/ha). Za preprečevanje okužb so nujna preventivna tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi, in sicer s porabo vode, ki omogoči dobro omočenost krošnje. Zatiranje breskove kodravosti v času brstenja ter po odpadanju listja z bakrovimi pripravki zavira tudi razvoj plodove monilije. Tretiranja se opravlja v času trdenja koščice in v času pred obiranjem v skladu z registracijo uporabljenih sredstev. Ključna škropljenja za preprečevanje okužb so v času brstenja, trdenja koščice, v času rasti plodičev in v jesenskem času. Pomembno je preprečevati poškodbe plodov zaradi žuželk ali mehanskih dejavnikov in ukrepati v roku 12 ur po eventualnem viharju ali toči.</p> <p>Pripravka je treba menjavati zaradi nevarnosti nastanka odpornosti.</p> |              |                           |            |                           |                                                                                              |
| <p><b>Bolezni lesa</b><br/> <b>Ožig breskove skorje</b><br/> <i>(Fusicoccum amygdali)</i><br/> <b>Breskov rak</b><br/> <i>(Cytospora sp.)</i></p> | <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b><br/> Sprotno odstranjevanje in sežiganje vseh okuženih vejic ali debelejših vej. Iz okuženih nasadov tudi sicer se odstrani ves les in se ga zažge. Občutljive sorte se ne sadi na zelo vlažne lege. S primerno poletno rezjo je treba povečati zračnost krošnje. Poskrbeti za skladno gnojenje z dušikom, da se prepreči prekomerno rast in občutljivost za te bolezni.<br/> Če so nastale poškodbe lesa zaradi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ditianon     | Delan 700 WG              | 0,75 kg/ha | ČU 2XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                  | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | naravnih (toča, veter, škodljivci) ali drugih dejavnikov (obrezovanje) je treba tak nasad čim prej poškropiti z ustreznim fungicidom, z namenom razkuževanja ran, če to dovoljuje karenca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                           |               |                           |                                                                                                                                        |
| BAKTARIOZE<br><b>Breskova bakterijska pegavost</b><br>( <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> )                                                                                                             | <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b><br/>Na območjih, kjer je bolezen ugotovljena je priporočljivo saditi le sorte, ki so na bolezen odporne ali malo občutljive. V novih nasadih se sadi le sadilni material, ki je preverjeno zdrav. Iz okuženih nasadov se odstrani ves les in ga zažgemo. Stransko delovanje na bakterijske bolezni pa imajo bakrovi pripravki, s katerimi se zatira druge glivične bolezni na breskvah in nektarinah.</p> <p><b>Kemično zatiranje:</b><br/>Tretira se v fenoloških fazah od BBCH 10 (odganjanje listov) do BBCH 89 (zrelost plodov)</p> | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha | ni potrebna 6XL           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
| <b>Siva breskova uš</b><br>( <i>Myzus persicae</i> )<br><br><b>Zelena breskova uš</b><br>( <i>Myzus varians</i> )<br><br><b>Črna breskova uš</b><br>( <i>Brachycaudus persicae</i> )<br><br><b>Rjava breskova uš</b> | Zatiranje je upravičeno samo, če je presežen prag škodljivosti. Najprimernejši čas za pregled in zatiranje je takoj po cvetenju.<br><br><b>Prag škodljivosti:</b><br><b>Siva breskova uš:</b> 3 % naseljenih brstov pred cvetenjem, oziroma 7 % napadenih poganjkov po cvetenju. Za nektarine je tudi po cvetenju prag škodljivosti 3 %;                                                                                                                                                                                                                               | flonikamid                                                | Afinto                    | 0,14 kg/ha    | 21 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Teppeki                   | 0,14 kg/ha    | 21 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                     |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                 | UKREPI                                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                   | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Brachycaudus schwartzi)<br><br><b>Medena breskova uš</b><br>(Hyalopterus amygdali) | <u>Zelena breskova uš:</u> 10% napadenih poganjkov;<br><u>Črna breskova uš, rjava breskova uš:</u> 7% napadenih poganjkov<br><br><u>Medena breskova uš:</u> navzočnost | acetamiprid     | Mospilan 20 SG            | 0,025-0,04%               | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        | azadirachtin A  | Neemazal-T/S              | 1,5 l/ha                  | 7                         | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 L/ha                   | Karenca ni potrebna       | Zimsko ali pred pomladansko tretiranje, pred začetkom vegetacije; Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        | pirimikarb      | Pirimor 50 WG             | 0,075 % (max. 0,75 kg/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 60 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        | piretrin        | Asset Five                | 0,96 L/ha                 | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                   |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                            | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                       | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                      | ODMEREK                                                                             | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breskov zavijač</b><br>( <i>Cydia molesta</i> )<br><br><b>Breskov molj</b><br>( <i>Anarsia lineatella</i> ) | <b>Prag škodljivosti:</b><br><u>Breskov zavijač:</u> od 2. generacije naprej več kot 10 ulovljenih metuljčkov na feromonsko vabo na teden.<br><u>Breskov molj:</u> od 2. generacije naprej več kot 7 ulovljenih metuljčkov na feromonsko vabo na teden.<br><br>Glede zatiranja breskovega zavijača je treba slediti napovedim opazovalno napovedovalne službe. Proti 2. rodu se škropi 7-8 dni po tem, ko je bil presežen prag škodljivosti, pri naslednjih rodovih pa 4-6 dni po prekoračitvi praga škodljivosti. Najprimernejši čas za zatiranje 2. rodu se lahko določi tudi iz vsote efektivnih temperatur. Ta znaša 20 °C števisi od začetka leta ulova metuljčkov na feromonske vabe, oziroma 75 °C števisi od dneva, ko je bil presežen prag škodljivosti. | emamektin                                          | Affirm                                                         | 3-4 kg/ha                                                                           | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | klorantraniliprol                                  | Coragen                                                        | 18-20 mL/hL(breskov zavijač);<br><br>16 mL/hL (breskov molj)<br><br>(max. 0,3 L/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | spinetoram                                         | Delegate 250 WG                                                | 0,3 kg/ha                                                                           | 7 dni                     | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z-8-dodecen-1-il acetat                            | Ecodian CM (metoda zbeganja samcev; le za breskovega zavijača) | 2.000-3.000 kom dispenzerjev/ha                                                     | ČU                        | Feromonske dispenzorje se postavi pred ali ob začetku letanja metuljev.                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | spinosad (spinosin A + spinosin D)                 | Laser Plus                                                     | 0,25 l/ha                                                                           | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> | Lepinox Plus                                                   | 1 kg/ha                                                                             | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                          |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNA SNOV                     | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                      | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                                                                              |                           | brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                                                    |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | klorantraniliprol                | Voliam                    | 18-20 mL/hL (breskov zavijač);<br>16 mL/hL (breskov molj)<br>(max. 0,3 L/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
| <b>Resarji</b><br>( <i>Thrips</i> spp.)                    | Resarji redno povzročajo škodo samo na nektarinah. Med cvetenjem spremljamo številčnost populacije in sicer, ko je vreme sončno. Če je ugotovljena večja navzočnost resarjev v cvetovih, se tretira nektarine takoj po cvetenju. Istočasno se lahko v tej fazi zatre tudi uši. | <i>Beauveria bassiana</i>        | Naturalis                 | 1,5 L/ha                                                                     | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | spinetoram                       | Delegate 250 WG           | 0,3 kg/ha                                                                    | 7 dni                     | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | spinosad (spinosin A+spinosin D) | Laser Plus                | 0,25 L/ha                                                                    | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
| <b>Murvov kapar</b><br>( <i>Pseudauleaspis pentagona</i> ) | V primeru močnejšega napada kaparjev se škropi v času brstenja z oljnim pripravkom v 3,0% koncentraciji.                                                                                                                                                                       | parafinsko olje                  | Ovitex                    | 20 L/ha                                                                      | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                | UKREPI                                                                                                                                                                                           | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rdeča sadna pršica</b><br><i>(Panonychus ulmi)</i><br><br><b>Navadna pršica</b><br><i>(Tetranychus urticae)</i> | Če se dosledno upošteva načela integriranega varstva, se rdeča sadna pršica redkeje prerazmnoži. V maju in v juniju je treba vsakih 14 dni pregledati stanje škodljivca, da nas ta ne preseneti. | parafinsko olje | Belo olje Karsia          | 10 L/ha na meter višine krošnje; najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha                                           | ČU                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | parafinsko olje | Frutapon                  | 10 L/ha na meter višine krošnje; najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha                                           | ČU                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 L/ha                                                                                                          | Karenca ni potrebna       | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | abamektin       | Vertimec PRO              | 0,075 %, 0,75 L/ha (navadna pršica, breskova rjasta pršica); 0,1% (1 L/ha); max. 1,125 L/ha (rdeča sadna pršica) | 14                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.<br><b>Zaloge v uporabi do 30.9.2024</b> |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                             | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AKTIVNA SNOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO        | ODMEREK       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breskov škržat</b><br>( <i>Asymmetrasca decedens</i> ) in<br><b>drugi občasni škodljivci</b> | <b><u>Kemično zatiranje:</u></b><br>V Republiki Sloveniji NI registriranih sredstev za zatiranje omenjenih škodljivcev.<br>V nasadih v bližini gozdov občasno povzročajo večjo škodo stenice. V takih nasadih se je treba v kritičnih obdobjih (v času slačenja breskev do debeline oreha in v juliju) izogibati hkratni košnji podrasti in vegetacije v neposredni bližini nasadov (kanali, brežine), ker se sicer stenice preselijo s trave in zeli na breskve. Zato je priporočljivo izmenično mulčenje ali košnja vsake druge vrste v medvrstnem prostoru. Za morebitno kemično zatiranje se posvetujemo s strokovno službo za varstvo rastlin.<br>V primeru močnejšega pojava breskovega škržata se posvetujemo s strokovno službo za varstvo rastlin. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |               |                           |                                                                                              |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br>( <i>Drosophila suzukii</i> )                                   | Storiti vse potrebno, da ne pride do gnitja plodov. Vonj gnijočega sadja privablja odrasle osebkne plodove vinske mušice, katerih samice v plodove izlegajo jajčeca. Ličinke lahko povzročijo občutno gospodarsko škodo na plodovih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piretrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asset Five                       | 0,96 L/ha     | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | deltametrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Decis Trap plodova vinska mušica | 100 vab na ha | ni potrebna               |                                                                                              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaba je že pripravljena za neposredno uporabo. Posamezno past se vzame iz ovojne vrečke in se jo obesi, na sredino krošnje in višine rastline, npr. na srednjo žico v opori, pri koščičastem sadju na višino 1,8 - 2 m od tal. Vabe učinkovito delujejo 100 dni in naj ostanejo v nasadih do zaključka spravila pridelka. Po končani uporabi je treba vabe odstraniti iz nasada. |                                  |               |                           |                                                                                              |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | spinosad (spinosin A+spinosin D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laser Plus                       | 0,25 l/ha     | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> )                                   | Je tujerodna škodljiva vrsta, ki se je v prejšnjih letih pojavljala zlasti na Primorskem. Kemično zatiranje je upravičeno le, če pride do prerazmnožitve škodljivca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piretrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asset Five                       | 0,96 L/ha     | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | deltametrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Decis 100 EC                     | 75 mL/ha      | 7 dni                     | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne                                            |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                 | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |              |                           |                         |                           | površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                   |
|                     |        | deltametrin  | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                | 7                         | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                     |        | acetamiprid  | Mospilan 20 SG            | 0,05 % (max. 0,5 kg/ha) | 14                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |

#### 11.4 INTEGRIRANO VARSTVO MARELIC

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                      | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Listna luknjičavost koščičarjev</b><br>( <i>Stigmina carpophila</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>poskrbeti za usklajeno gnojenje, zlasti z dušikom,</li> <li>s poletno rezjo povečujemo zračnost drevesnih krošenj in omejujemo bujnost rasti, okužene veje izrežemo in odstranimo iz nasada.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Proti luknjičavosti koščičarjev lahko z | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid | Badge WG                  | 3,5 kg/ha   | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bakrov oksiklorid                    | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                    | UKREPI                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV      | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK              | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | bakrenimi sredstvi škropimo že jeseni takoj po odpadanju listja ali pa pozimi v fenološki fazi B. Sredstvo na osnovi aktivne snovi ditianon lahko uporabljamo samo v času od končanega obiranja do konca mirovanja. | bakrov oksiklorid | Cuprablau Z 35 WP         | 2 kg/ha              | ČU 3XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | ditianon          | Delan 700 WG              | 0,75 kg/ha           | ČU 2XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | kaptan            | Orthocide 80 WG           | 1,8 kg/ha            | 21 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
| <b>Sadna monilija</b><br>( <i>Monilinia fructigena</i> )<br><b>Plodova monilija</b><br>( <i>Monilinia fructicola</i> ) | Čeprav je najpogostejša na breskvah in nektarinah, napada vse koščičarje. Zatiranje je opisano pri breskvah in nektarinah.                                                                                          | ciprodinil        | Chorus 50 WG              | 0,6 kg/ha            | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | difenokonazol     | Mavita 250 EC             | 0,03%; max 0,45 L/ha | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | difenokonazol     | Score 250 EC              | 0,03%; max 0,45 L/ha | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                             | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | ciprodinil + fludioksonil                                 | Switch 62,5 WG            | 0,08 %, max. 1 kg/ha                                                | 14 dni 2xL                | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                                                      |
|                     |        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24               | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha (najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; Zmanjševanje okužb. Tudi za sivo plesen ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> ) |
|                     |        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha                                                       | ni potrebna 6XL           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.                                                                           |
|                     |        | kalijev hidrogen karbonat                                 | Karbicure                 | 5 kg/ha                                                             | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.                                                                           |
|                     |        | fenpirazamin                                              | Prolectus                 | 400 g na 1m višine krošnje                                          | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni                                                                                                                                                                                  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                 | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNA SNOV                                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                           | na ha (max 1,2 kg/ha)                            |                           | pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | mefentriflukonazol                                                                       | Revyona                   | 1,8 L/ha                                         | 3 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 <i>subtilis</i> | Serenade Aso              | 8 L/ha                                           | ni potrebna               | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | boskalid+piraklostrobin                                                                  | Signum                    | 0,25 kg/ha na 1m višine krošnje (max.0,75 kg/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
| <b>Cvetna monilija</b><br>( <i>Monilinia laxa</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>marelice sadimo na zračne lege,</li> <li>poskrbeti je treba za usklajeno gnojenje z dušikom,</li> <li>okužene poganjke porežemo in jih odstranimo iz nasada,</li> </ul> | ciprodinil                                                                               | Chorus 50 WG              | 0,5 kg/ha                                        | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                             |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNA SNOV                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                         | KARENCA dovoljeno št. rab                                                                                                                        | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>marelice temeljito oberemo, da se glivica ne ohranja v obliki mumij na drevesih.</li> </ul> <p><b>Kemično varstvo:</b><br/>Marelice se tretira z enim od navedenih pripravkov v začetku cvetenja, ko je odprtih približno 10 % cvetov.<br/>Škropi se še enkrat, ko začnejo odpadati prvi venčni listi oziroma pred napovedanim dežjem.<br/>Če je med cvetenjem vreme deževno, je tretiranje nujno potrebno, sicer je izpad pridelka zelo velik.</p> | difenokonazol                                                            | Duaxo koncentrat          | 1,1-3,3 L/ha                                    | ČU 2XL<br>(prvic na zacvetku cvetenja, ko je odprtih 10% cvetov in drugic, ko začnejo odpadati prvi venci listi oziroma pred napovedanim dežjem) | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda.; v odmerku 1,1L na višinski meter krošnje/ha. Najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3 L/ha. |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fenpirazamin                                                             | Prolectus                 | 330 g na višinski m krošnje na ha (max 1 kg/ha) | 1 dan 3XL                                                                                                                                        | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 10 m od 2. reda                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mefentriflukonazol                                                       | Revyona                   | 1,8 L/ha                                        | 3 dni 2XL                                                                                                                                        | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713subtilis</i> | Serenade Aso              | 8 L/ha                                          | ni potrebna                                                                                                                                      | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | boskalid+ piraklostrobin                                                 | Signum                    | 0,25 kg/ha/m višine krošnje (max 0,75 kg/ha)    | 7 dni                                                                                                                                            | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                                                                                                                                                          |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                     | UKREPI                                                                                                                      | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                 | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                             |                                                                      |                           |                         |                           | brega voda 1. in 2. reda                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                             | izofetamid                                                           | Zenby                     | 0,9 L/ha                | ČU 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |
|                                                         |                                                                                                                             | baker v obliki bakrovega oksiklorida                                 | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha             | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                         |                                                                                                                             | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo-X                   | 1,5 – 2,5 kg/ha         | ni potrebna 6XL           | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                         |                                                                                                                             | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid                                 | Badge WG                  | 3,5 kg/ha               | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                         |                                                                                                                             | ciprodinil + fludioksonil                                            | Switch 62,5 WG            | 0,08 %<br>(max 1 kg/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
| <b>Breskov škrlup</b><br>( <i>Venturia carpophila</i> ) | V mokrih letih se lahko breskov škrlup močnejše pojavi tudi na marelicah. Povzroča površinsko žametno krastavost in pozneje | baker v obliki bakrovega oksiklorida                                 | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha             | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                                 |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                      | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                  | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                  | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | plutavost plodov. Poskrbeti je treba za zračnost krošnje, zato je odstranjevanje odvečnih bohotivk bistvenega pomena za manjši pojav bolezni.                                                                                                           |                 |                           |                          |                           | brega voda 1. in 2. reda                                                                           |
| Marelična pepelovka<br>( <i>Podosphaera tridactyla</i> ) | <b>Tehnološki ukrepi:</b><br>Poskrbeti je treba za zračnost krošnje, zato je odstranjevanje odvečnih bohotivk bistvenega pomena za manjši pojav bolezni in tudi za kakovost varstva s fungicidi. Poskrbeti je treba za uravnoteženo gnojenje z dušikom. | močljivo žveplo | Biotip Sulfo 800 SC       | 6 L/ha                   | 14 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Vertipin                  | 5 L/ha                   | 3 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Cosan                     | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Kumulus DF                | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Microthiol disperss       | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Microthiol special        | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Pepelin                   | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Sulfar                    | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Thiovit jet               | 5,0-7,5 kg/ha            | 21 dni                    |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Vindex 80 WG              | 5,0-7,5 kg/ha            | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Azumo WG                  | 7,5 kg/ha                | 7 dni                     |                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | difenokonazol   | Score 250 EC              | 0,03%<br>(max 0,45 L/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Mavita 250 EC             | 0,03%<br>(max 0,45 L/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                             | UKREPI                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK      | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | fluksapiroksad | Sercadis                  | 0,15 L/ha    | 21 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | COS-OGA        | Fytosave                  | 2 L/ha       | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
| <b>Češpljeva rja</b><br>( <i>Tranzchelia pruni-spinosae</i> )                                                                                   | Češpljeva rja se pri marelicah običajno pojavi šele poleti po obiranju marelic in povzroča prezgodnje odpadanje listja.<br>Kemično zatiranje: Za to bolezen v Sloveniji NI registriranega nobenega sredstva. |                |                           |              |                           |                                                                                                    |
| <b>Listne uši:</b><br><b>češpljeva mokasta uš</b><br>( <i>Hyalopecterus pruni</i> )<br><br><b>siva breskova uš</b><br>( <i>Myzus persicae</i> ) | Češpljeva mokasta uš se običajno pojavlja v otokih, a se lahko zelo namnoži. Zato škropimo samo napadena drevesa.<br><br><b>Prag škodljivosti:</b><br>Češpljeva mokasta uš: 5% napadenih poganjkov.          | flonikamid     | Afinto                    | 0,14 kg/ha   | 21 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                | Teppeki                   | 0,14 kg/ha   | 21 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | acetamiprid    | Mospilan 20 SG            | 0,025-0,04 % | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                                 |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                  | AKTIVNA SNOV                     | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK   | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |           |                           | brega voda 1. in 2. reda                                                                                                                                      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | azadirachtin A                   | Neemazal-T/S              | 1,5 L/ha  | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | piretrin                         | Asset Five                | 0,96 L/ha | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | parafinsko olje                  | Ovitex                    | 20 L/ha   | ni potrebna               | Zimsko ali pred pomladansko tretiranje, pred začetkom vegetacije; Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
| <b>Breskov zavijač</b><br>( <i>Cydia molesta</i> )<br><b>Breskov molj</b><br>( <i>Anarsia lineatella</i> ) | <b>Prag škodljivosti:</b><br><u>Breskov zavijač:</u> od 2. generacije naprej več kot 10 ulovljenih metuljčkov na feromonsko vabo na teden.<br><u>Breskov molj:</u> od 2. generacije naprej več kot 7 ulovljenih metuljčkov na feromonsko vabo na teden. | spinetoram                       | Delegate 250 WG           | 0,3 kg/ha | 7 dni                     | V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat. Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | spinosad (spinosin A+spinosin D) | Laser Plus                | 0,25 L/ha | 7 dni                     | Pri izhodiščni porabi 500 l vode na višinski meter                                                                                                            |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                         | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                           | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                           |                                                   |                           | krošnje. Tretira se v času odlaganja jajcec oziroma ob višku leta metuljckov. Tretira se največ dvakrat v eni rastni sezoni. Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
| <b>Mali zimski pedic</b><br>( <i>Operophtera brumata</i> ) in drugi<br><b>brstni sukači</b> | <b><u>Mehanično zatiranje:</u></b><br>Preden nastopi jeseni prvi mraz ovijemo debela češenj z nekaj centimetrov širokimi lepljivimi trakovi, ki prepreči samicam malega zimskega pedica, da bi splezale na drevo in odložile jajčeca.<br><br><b><u>Kemično zatiranje:</u></b><br>S parafinskim oljem se tretira v razvojni fazi C-D; uporabljamo ga največ 1 krat v eni rastni dobi. S pripravkom Agree WG se zatiranje opravi v času izleganja jajčec oziroma, ko so ličinke v prve in drugem razvojnem stadiju (L1, L2) | <i>Bacillus thuringiensis</i><br>var. <i>aizawai</i> | Agree WG                  | 1 kg/ha                                           | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Azadirachtin A                                       | NeemAzal T/S              | 1,5 L/meter<br>višine krošnje<br>(max. 4,5 L/ha)  | 14 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda                                                                                                                       |
| <b>Rdeča sadna pršica</b><br>( <i>Panonychus ulmi</i> )                                     | Če dosledno upoštevamo načela integriranega varstva se rdeča sadna pršica redkeje prerezamnoži. V maju in v juniju je treba vsakih 14 dni pregledati stanje škodljivca, da nas ta ne preseneti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | parafinsko olje                                      | Belo olje Karsia          | 10 L/ha na meter višine krošnje<br>(max. 30 L/ha) | ČU                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                                                              |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                           | UKREPI                                                                                                                                                               | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                        | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                      |              | Frutapon                  | 10 L/ha na meter višine krošnje (max. 30 L/ha) | ČU                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                      |              | Ovitex                    | 20 L/ha                                        | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                      | abamektin    | Vertimec PRO              | 0,1% (1 L/ha); max. 1,125 L/ha                 | 14 dni                    | V eni rastni sezoni ga lahko uporabimo enkrat. Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda;<br><b>Zaloge v uporabi do 30.9.2024</b> |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> ) | Je tujerodna škodljiva vrsta, ki se je v prejšnjih letih pojavljala zlasti na Primorskem. Kemično zatiranje je upravičeno le, če pride do prerazmnožitve škodljivca. | deltametrin  | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                                       | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                      |              | Decis 100 EC              | 75 mL/ha                                       | 7 dni                     | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                         |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                    | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | acetamiprid  | Mospilan 20 SG            | 0,05 %<br>(max. 0,5 kg/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                     |        | piretrin     | Asset Five                | 0,96 L/ha                  | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |

#### 11.5 INTEGRIRANO VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listna luknjičavost koščičarjev<br>( <i>Stigmina carpophila</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>poskrbeti za usklajeno gnojenje, zlasti z dušikom,</li> <li>s poletno rezjo povečujemo zračnost drevesnih krošenj in omejujemo bujnost rasti.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Proti luknjičavost koščičarjev se lahko škropi že jeseni takoj po odpadanju listja ali pa pozimi (spomladi) v fenološki fazi B-C s pripravki na osnovi bakra. Sredstvo na osnovi aktivne snovi ditianon se lahko uporablja samo v času od končanega obiranja do konca mirovanja. | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid | Badge WG                  | 3,5 kg/ha   | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bakrov oksiklorid                    | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha | ČU 4 XL                   | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bakrov oksiklorid                    | Cuprablau Z 35 WP         | 2 kg/ha     | ČU 3XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                 | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNA SNOV            | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ditianon                | Delan 700 WG              | 0,75 kg/ha                                                       | ČU 2XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kaptan                  | Orthocide 80 WG           | 1,8 kg/ha                                                        | 21 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |
| <b>Cvetna monilija</b><br>( <i>Monilinia laxa</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– češnje in posebno višnje se sadi na zračne lege,</li> <li>– poskrbeti je treba za usklajeno gnojenje z dušikom,</li> <li>– okužene poganjke se poreže in se jih odstrani iz nasada,</li> <li>– češnje in višnje se temeljito obere, da se glivica ne ohranja v obliki mumij na drevesih.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Višnje in zelo občutljive sorte češenj se tretira z enim od navedenih pripravkov v začetku cvetenja, ko je odprtih približno 10 % cvetov. Če je med cvetenjem deževno vreme, se škropi še enkrat, ko začnejo odpadati prvi | difenokonazol           | Duaxo koncentrat          | 1,1-3,3 L/ha                                                     | ČU 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fluopiram + tebukonazol | Luna experience           | max 0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha)                  | 7 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fenpirazamin            | Prolectus                 | max. 1 kg/ha; 330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar | 1 dan 3XL                 | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 10 m od 2. reda |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mefentriflukonazol      | Revyona                   | 1,8 L/ha                                                         | 3 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                        | AKTIVNA SNOV                                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | venčni listi oziroma pred napovedanim dežjem. | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 <i>subtilis</i> | Serenade aso              | 8 L/ha                                        | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |                                               | Boskalid + piraklostrobin                                                                | Signum                    | 0,25 kg/ha/m višine krošnje (max 0,75 kg/ha)  | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                     |                                               | fenheksamid                                                                              | Teldor SC 500             | 0,5 L/ha na 1m višine krošnje (max. 1,5 L/ha) | 3 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                     |                                               | izofetamid                                                                               | Zenby                     | 0,9 L/ha                                      | 1 dan                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                     |                                               | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747                     | Amylo-X                   | 1,5–2,5 kg/ha                                 | ni potrebna 6XL           | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                     |                                               | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid                                                     | Badge WG                  | 3,5 kg/ha                                     | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                         | UKREPI                                                                                                                                                                                          | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | ciprodinil + fludioksonil                   | Switch 62,5 WG            | 0,08 %<br>(max 1 kg/ha)                                                | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha                                                            | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |
| <b>Plodova monilija</b><br>( <i>Monilinia fructicola</i> )                  | Najpogostejša je na breskvah in nektarinah, napada pa vse koščičarje. Zatiranje je opisano pri breskvah in nektarinah.                                                                          | ciprodinil + fludioksonil                   | Switch 62,5 WG            | 0,08 %<br>(max 1 kg/ha)                                                | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
| <b>Sadna gniloba</b><br>( <i>Monilinia fructigena</i> ,<br><i>M. laxa</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• češnje in posebno višnje se sadi na zračne lege,</li> <li>• poskrbeti je treba za usklajeno gnojenje z dušikom.</li> </ul> | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha                                                            | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                      | AKTIVNA SNOV                                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>češnje in višnje se temeljito obere, da se glivica ne ohranja v obliki mumij na drevesih.</li> </ul> | fenheksamid                                                                              | Libreto                   | 0,5 L/ha na 1 m višine krošnje (max. 1,5 L/ha)                   | 3 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |
|                     |                                                                                                                                             | fluopiram + tebukonazol                                                                  | Luna experience           | max 0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha)                  | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |
|                     |                                                                                                                                             | fenpirazamin                                                                             | Prolectus                 | max. 1 kg/ha; 400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar | 1 dan 3XL                 | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 10 m od 2. reda |
|                     |                                                                                                                                             | mefentriflukonazol                                                                       | Revyona                   | 1,8 L/ha                                                         | 3 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |
|                     |                                                                                                                                             | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 <i>subtilis</i> | Serenade aso              | 8 L/ha                                                           | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda  |
|                     |                                                                                                                                             | boskalid+ piraklostrobin                                                                 | Signum                    | 0,25 kg/ha/m višine krošnje (max 0,75 kg/ha)                     | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda         |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                             | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | fenheksamid                                                          | Teldor SC 500             | 0,5 L/ha na 1m višine krošnje (max. 1,5 Lha)                        | 3 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | ciprodinil + fludioksonil                                            | Switch 62,5 WG            | 0,08 % (max 1 kg/ha)                                                | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24                          | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha (najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo-X                   | 1,5–2,5 kg/ha                                                       | ni potrebna 6XL           | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid                                 | Badge WG                  | 3,5 kg/ha                                                           | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |
| <b>Češnjeva listna pegavost</b><br>( <i>Blumeriella jaapii</i> )<br><b>Češnjeva listna sušica</b> | Jesensko ali predspomladansko škropljenje proti listni luknjičavosti zmanjša pojavljanje češnjeve listne pegavosti in češnjeve listne sušice. Sredstvo na osnovi aktivne snovi ditianon se lahko uporablja samo v | bakrov oksiklorid                                                    | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha                                                         | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM          | UKREPI                                         | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                         | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Apiognomonina erythrostoma) | času od končanega obiranja do konca mirovanja. | ditianon                  | Delan 700 WG              | 0,75 kg/ha                                      | ČU                        | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                              |                                                | fluopiram + tebukonazol   | Luna experience           | max 0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha) | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                              |                                                | kaptan                    | Merpan 80 WDG             | max. 2,25 kg/ha                                 | 21 dni                    |                                                                                             |
|                              |                                                | boskalid + piraklostrobin | Signum                    | 0,25 kg/ha/m višine krošnje (max 0,75 kg/ha)    | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                              |                                                | dodin                     | Syllit 400 SC             | 1,9 L/ha                                        | 14 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |
|                              |                                                | dodin                     | Syllit 544 SC             | 1,4 L/ha                                        | 14 dni                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                           | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                   | KARENCA dovoljeno št. rab                                                                      | OPOMBE                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Črna češnjeva uš<br>( <i>Myzus cerasi</i> )   | Zatiranje je upravičeno samo, če je presežen prag škodljivosti.<br>Najprimernejši čas za pregled in zatiranje je takoj po cvetenju.<br><br><b>Prag škodljivosti:</b><br>3 % napadenih poganjkov po cvetenju.                                                                                                                                                                                        | flonikamid                                  | Afinto                    | 0,14 kg/ha                | 14 dni                                                                                         | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda.<br>Uporaba dovoljena samo po cvetenju! |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | flonikamid                                  | Teppeki                   | 0,14 kg/ha                | 14 dni                                                                                         | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda.<br>Uporaba dovoljena samo po cvetenju! |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | spirotetramat                               | Movento SC 100            | 1,5 L/ha                  | 21 dni<br><br><b>Zaloge v prodaji do: 30.10.2024</b><br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda.<br>Uporaba dovoljena samo po cvetenju! |
| Češnjeva muha<br>( <i>Rhagoletis cerasi</i> ) | Pri integriranem pridelovanju je obvezno spremljanje leta češnjeve muhe na rumene lepljive vabe. Vabe nastavimo, ko zorijo zgodnje sorte češenj. Škodljivca zatiramo le, če je presežen prag škodljivosti.<br><br><b>Prag škodljivosti</b> je presežen, če ulovimo 1 muho na 2 postavljeni vabi do faze, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno. Velja za sorte, ki zorijo od 4. češnjevega | hidrolizirane beljakovine + reg. insekticid | Nutrel + reg. Insekticid  | 1,5 %                     |                                                                                                |                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | deltametrin                                 | Decis Trap češnjeva muha  | 100 vab na ha             | ČU                                                                                             |                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ciantraliniprol                             | Exirel                    | 75 mL/hL<br>(max. 1 L/ha) | 7 dni                                                                                          | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | acetamiprid                                 | Mospilan 20 SG            | 0,375 kg/ha;<br>0,0375 %  | 14 dni                                                                                         | Upoštevati 20 m netretiran varnostni                                                                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                         | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AKTIVNA SNOV                                      | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | tedna naprej. Pri zgodnejših sortah češnjeve muhe ni potrebno zatirati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |                               |                           | pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Beauveria bassiana</i>                         | Naturalis                 | 2,0 L/ha                      | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda. |
| <b>Mali zimski pedic</b><br>( <i>Operophtera brumata</i> )<br>in <b>drugi brstni sukači</b> | <b><u>Mehanično zatiranje:</u></b><br>Preden nastopi jeseni prvi mraz se ovije debela češenj z nekaj centimetrov širokimi lepljivimi trakovi, ki prepreči samicam malega zimskega pedica, da bi splezale na drevo in odložile jajčeca.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>S parafinskim oljem se tretira v razvojni fazi C-D; uporablja se ga največ 1 krat v eni rastni dobi. | ciantraniliprol                                   | Exirel                    | 50-60 mL/hL (max. 0,9 L/ha)   | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Agree WG                  | 1 kg/ha                       | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda. |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | azadirahatin A                                    | NeemAzal T/S              | 1,5 L/ 1 meter višine krošnje | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.        |
| <b>Kaparji</b> (Coccidae)                                                                   | Zatiranje kaparjev je pri češnjah in višnjah redkokdaj potrebno. Omenjena sredstva uporabimo le, če smo pri zimskem pregledu vejic ugotovili močnejši napad.                                                                                                                                                                                                                         | parafinsko olje                                   | Ovitex                    | 20 L/ha                       | ni potrebna               | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.        |
|                                                                                             | Proti slivovi listni pršici se sredstvo uporabi v primeru močnejšega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | močljivo žveplo                                   | Microthiol special        | 6 kg/ha                       | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni                                                                |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                           | UKREPI                                                                                                                                                                                                                               | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO        | ODMEREK                     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slivova listna pršica</b><br>( <i>Aculus fockeui</i> )     | napada v pretekli rastni sezoni v razvojni fazi brstenja (BBCH 03-09).                                                                                                                                                               |                 | Sulfar                           | 6 kg/ha                     | 7 dni                     | pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 5 m od 2. reda.                               |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br>( <i>Drosophila suzukii</i> ) | Storiti vse potrebno, da ne pride do gnitja plodov. Vonj gnijočega sadja privablja odrasle osebkne plodove vinske mušice, katerih samice v plodove izlegajo jajčeca. Ličinke lahko povzročijo občutno gospodarsko škodo na plodovih. | ciantraniliprol | Exirel                           | 50-60 mL/hL (max. 0,9 L/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | spinosad        | Laser Plus                       | 0,15 L/ha                   | 7 dni                     | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | piretrin        | Asset Five                       | 0,96 L/ha                   | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | deltametrin     | Decis Trap plodova vinska mušica | 100 vab na ha               | ČU                        |                                                                                              |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> ) | Je tujerodna škodljiva vrsta, ki se je v prejšnjih letih pojavljala zlasti na Primorskem. Kemično zatiranje je upravičeno le, če pride do prerazmnožitve škodljivca.                                                                 | piretrin        | Asset Five                       | 0,96 L/ha                   | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | deltametrin     | Decis 100 EC                     | 75 mL/ha                    | 7 dni                     | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------|--------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | deltametrin  | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha         | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                     |        | acetamiprid  | Mospilan 20 SG            | max. 0,375 kg/ha | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |

#### 11.6 INTEGRIRANO VARSTVO ČEŠPELJ IN SLIV

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                     | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Listna luknjčavost koščičarjev</b><br>( <i>Stigmina carpophila</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>poskrbeti za usklajeno gnojenje, zlasti z dušikom,</li> <li>s poletno rezjo se povečuje zračnost drevesnih krošenj in omejemo bujnost rasti.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Proti luknjčavost koščičarjev se lahko škropi že jeseni po odpadanju listja ali pozimi v fenološki fazi B s pripravkom na osnovi bakra. Sredstvo na osnovi aktivne snovi ditianon se lahko uporablja samo v | baker v obliki bakrovega hidroksida + baker v obliki bakrovega oksiklorida | Badge WG                  | 3,5 kg/ha   | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega oksiklorida                                       | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha | ČU 4XL                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega oksiklorida                                       | Cuprablau Z 35 WP         | 2 kg/ha     | ČU 3XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje                           |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                        | UKREPI                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | času od končanega obiranja do konca mirovanja.                                                                                    |                                                                            |                           |                                             |                           | brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                              |
|                                                            |                                                                                                                                   | ditanon                                                                    | Delan 700 WG              | 0,75 kg/ha                                  | ČU 2XL                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                                                            |                                                                                                                                   | fluopiram + tebukonazol                                                    | Luna experience           | 0,6 l/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha) | 7 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                                                            |                                                                                                                                   | kaptan                                                                     | Orthocide 80 WG           | 1,8 kg/ha                                   | 21 2XL                    | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
| <b>Plodova monilija</b><br>( <i>Monilinia fructicola</i> ) | Čeprav je najpogostejša na breskvah in nektarinah, se lahko okuži vse koščičarje. Zatiranje je opisano pri breskvah in nektarinah | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. Plantarum sev.74                  | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha                               | ni potrebna 6XL           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                                                            |                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega hidroksida + baker v obliki bakrovega oksiklorida | Badge WG                  | 3,5 kg/ha                                   | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                                                            |                                                                                                                                   | ciprodinil                                                                 | Chorus 50 WG              | 0,6 kg/ha                                   | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni                                                                                                        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                 | UKREPI                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                   |                                             |                           |                                                                             |                           | pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                                                      |
|                                                     |                                                                                                                                   | difenokonazol                               | Mavita 250 EC             | 0,22 L/ha                                                                   | 14 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. tudi za zatiranje češpljeve rje ( <i>Puccinia pruni</i> ) in pepelovke ( <i>Sphaerotheca</i> spp.) |
|                                                     |                                                                                                                                   |                                             | Score 250 EC              | 0,22 L/ha                                                                   | 14 dni                    |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     |                                                                                                                                   | ciprodinil + fludioksonil                   | Switch 62,5 WG            | 0,08 %<br>(max 1 kg/ha)                                                     | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                   | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,370 kg/ha<br><br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda                                                           |
| <b>Cvetna monilija</b><br>( <i>Monilinia laxa</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>poskrbeti je treba za usklajeno gnojenje z dušikom,</li> </ul> | ciprodinil                                  | Chorus 50 WG              | 0,5 kg/ha                                                                   | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                      |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                      | AKTIVNA SNOV                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>češplje in slive se temeljito obere, da se glivica ne ohranja v obliki mumij na drevesih.</li> </ul> | fluopiram + tebukonazol                                                  | Luna experience           | max 0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha)                  | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                     |                                                                                                                                             | fenpirazamin                                                             | Prolectus                 | max. 1 kg/ha; 330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar | 1 dan 3XL                 | Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 10 m od 2. reda                                    |
|                     |                                                                                                                                             | mefentriflukonazol                                                       | Revyona                   | 1,8 L/ha                                                         | 3 dni 2XL                 | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                     |                                                                                                                                             | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 | Serenade Aso              | 8 L/ha                                                           | ni potrebna               | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                     |                                                                                                                                             | boskalid + piraklostrobin                                                | Signum                    | 0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje (max. 0,75 kg/ha)               | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                     |                                                                                                                                             | izofetamid                                                               | Zenby                     | 0,9 L/ha                                                         | ČU                        | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje                                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                                                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                                                                            |                           |                                                                             |                           | brega voda 1. in 2. reda.                                                                                                              |
|                     |        | bakrov oksiklorid                                                          | Cuprblau Z 35 WG          | 1,6-2 kg/ha                                                                 | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                     |        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747       | Amylo-X                   | 1,5 -2,5 kg/ha                                                              | ni potrebna 6XL           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                     |        | baker v obliki bakrovega hidroksida + baker v obliki bakrovega oksiklorida | Badge WG                  | 3,5 kg/ha                                                                   | ČU                        | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                     |        | ciprodinil + fludioksonil                                                  | Switch 62,5 WG            | 0,08 % (max 1 kg/ha)                                                        | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda; 3x na sezono                              |
|                     |        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24                                | Taegro                    | 0,185-0,370 kg/ha<br><br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AKTIVNA SNOV      | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Češpljev kapar</b><br>( <i>Eulecanium corni</i> )                                                                              | Kapar sesa rastlinske sokove in tako drevesa izčrpava. Neprijetno je tudi obilno izločanje medene rose. Optimalen čas za njegovo zatiranje s pripravki na osnovi parafinskega olja je v zimskem ali pred pomladanskem obdobju (pred začetkom vegetacije).                                                                                                                                                                                                   | parafinsko olje   | Ovitex                    | 20 L/ha                     | ni potrebna               | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda |
| <b>Rumena češpljeva grizlica</b><br>( <i>Hoplocampa flava</i> )<br><b>Črna češpljeva grizlica</b><br>( <i>Hoplocampa minuta</i> ) | Vsaj teden dni pred cvetenjem se v nasadu obesi bele lepljive plošče. Na hektar se potrebuje 2 lepljivi plošči (35 x 20 cm). Plošče se pregleda takoj po cvetenju. Zatira se jo, če je bil presežen prag škodljivosti, ko odpade večina venčnih listov. Češpljeve grizlice povzročajo zgodnjo črvivost plodov. Umazano bele pagosenice se najde že v plodovih, ki so debeli komaj za droben lešnik.                                                         | acetamiprid       | Mospilan 20 SG            | 0,04 %                      | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.   |
| <b>Mali zimski pedic</b><br>( <i>Operophtera brumata</i> )<br><b>in drugi brstni sukači</b>                                       | <b><u>Mehanično zatiranje:</u></b><br>Preden nastopi jeseni prvi mraz se ovije debela z nekaj centimetrov širokimi lepljivimi trakovi, ki prepreči samicam malega zimskega pedica, da bi splezale na drevo in odložile jajčeca.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Prvo kontrolo brstov se opravi že pred cvetenjem. Če je napadenih več kot 5 % poganjkov, ne glede na vrsto škodljivca, se nasad tretira s pripravkom na osnovi klorantraniliprola. | klorantraniliprol | Coragen                   | 18-20 mL/hL (max. 0,3 L/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | klorantraniliprol | Voliam                    | 18-20 mL/hL (max. 0,3 L/ha) | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ciantraniliprol   | Exirel                    | max. 0,75 L/ha              | 7 dni                     | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje                               |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                   | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                                      | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                           |                                                  |                           | brega voda 1. reda in 2. reda.                                                                                                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> | Agree WG                  | 1 kg/ha                                          | ni potrebna               | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorsne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorsne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | azadirahatin A                                    | Neemazal-T/S              | 1,5 L/ha na meter višine krošnje (max. 4,5 L/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                         |
| <b>Češpljev zavijač</b><br>( <i>Cydia funebrana</i> ) | Češpljev zavijač je po načinu življenja zelo podoben jabolčnemu zavijaču in se pojavljata bolj ali manj istočasno. Prvi rod metuljčkov leta v maju in v začetku junija in povzroča junijsko črvivost češpelj. S tem na splošno ne povzroči velike škode, zato navadno prvega rodu ne zatiramo. Pomembnejši je drugi rod. Metuljčki letajo od sredine julija do konca avgusta in začrvivijo že debele plodove. | emamektin                                         | Affirm Opti               | 2,5 kg/ha                                        | 14 dni                    | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | klorantraniliprol                                 | Coragen                   | 18-20 mL/hL (max. 0,3 L/ha)                      | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | klorantraniliprol                                 | Voliam                    | 18-20 mL/hL (max. 0,3 L/ha)                      | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | spinetoram                                        | Delegate 250 WG           | 0,3 kg/ha                                        | 14 dni                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni                                                                                                 |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                | UKREPI                                                                                                                                                                                | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK        | KARENCA dovoljeno št. rab                        | OPOMBE                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                 |                           |                |                                                  | pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | ciantraniliprol | Exirel                    | max. 0,75 L/ha | 7 dni                                            | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.                                        |
| <b>Zelena češpljeva uš</b><br>( <i>Brachycaudus helichrysi</i> )<br><b>in mokasta češpljeva uš</b><br>( <i>Hyalopterus pruni</i> ) | Zelena češpljeva uš povzroča močno zvijanje listov in zavira rast poganjkov, mokasta češpljeva uš pa oblikuje obsežne kolonije na spodnji strani listov in izloča obilno medeno roso. | flonikamid      | Afinto                    | 0,14 kg/ha     | 21 dni                                           | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | piretrin        | Asset Five                | 0,96 L/ha      | 7 dni                                            | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | acetamiprid     | Mospilan 20 SG            | 0,025 –0,04 %  | 14 dni                                           | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | spirotetramat   | Movento SC 100            | 1,5 L/ha       | 21 dni<br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne                                    |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                     | UKREPI                                                                                         | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                |                 |                           |                                                  |                           | širine od meje brega voda 2. reda.                                                                                                     |
|                                                         |                                                                                                | azadirahrin A   | Neemazal – T/S            | 1,5 l/ha na meter višine krošnje (max. 4,5 l/ha) | 7 dni                     | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                           |
|                                                         |                                                                                                | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 l/ha                                          | ni potrebna               | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda                                         |
|                                                         |                                                                                                | flonikamid      | Teppeki                   | 0,14 kg/ha                                       | 21 dni                    | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. |
| <b>Rdeča sadna pršica</b><br>( <i>Panonychus ulmi</i> ) | Če se dosledno upošteva načela integriranega varstva se rdeča sadna pršica redkeje prerezmuži. | acekvinocil     | Kanemite SC               | 0,625 L/ha na 1 m višine krošnje                 | 28 dni                    | Upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.                                        |
|                                                         |                                                                                                | abamektin       | Vertimec PRO              | 0,1% (max. 1,125 L/ha)                           | 28 dni                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.<br><b>Zaloge v uporabi do 30.9.2024.</b>  |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                           | UKREPI                                                                                                                                                               | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                        | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                      | parafinsko olje | Belo olje Karsia          | 10 L/ha na meter višine krošnje (max. 30 L/ha) | ČU                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
|                                                               |                                                                                                                                                                      |                 | Frutapon                  | 10 L/ha na meter višine krošnje (max. 30 L/ha) | ČU                        | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> ) | Je tujerodna škodljiva vrsta, ki se je v prejšnjih letih pojavljala zlasti na Primorskem. Kemično zatiranje je upravičeno le, če pride do prerazmnožitve škodljivca. | deltametrin     | Decis 100 EC              | 75 mL/ha                                       | 14 dni                    | Upoštevati 40 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                               |                                                                                                                                                                      |                 | Decis 2,5 EC EC           | 0,5 L/ha                                       | 7 dni                     | Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. |
|                                                               |                                                                                                                                                                      | acetamiprid     | Mospilan 20 SG            | max. 0,5 kg/ha                                 | 14 dni                    | Upoštevati 20 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |
|                                                               |                                                                                                                                                                      | piretrin        | Asset Five                | 0,96 L/ha                                      | 7 dni                     | Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda  |





# 11.7 INTEGRIRANO VARSTVO JAGOD

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                          | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV                                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                             | KARENCA dovoljeno št. rab                        | OPOMBE                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siva plesen ali gniloba<br>( <i>Botriotinia fuckeliana</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– večje sadilne razdalje,</li> <li>– enovrstni sistemi sajenja,</li> <li>– zmerno gnojenje z dušikom,</li> <li>– zračne lege,</li> <li>– prekrivanje nasadov s tuneli,</li> <li>– ob spomladanskem čiščenju nasada, se odstrani vse odmrle in od bolezni poškodovane dele rastlin.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Škropi se v cvet, prvič ko je odprtih od 5 do 10% cvetov. škropljenje se ponovi do 3- krat, odvisno od vremenskih razmer in sredstva. | <i>Aureobasidium pullulans</i> (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) | Botector                  | 1 kg/ha (600 L vode)                                                | 1 dan; 6x interval med dvema tretiranji je 2 dni | od faze BBCH 61 (začetek cvetenja: približno 10% cvetov odprtih) do faze BBCH 89 (drugi pridelek: več plodov obarvanih); uporaba na prostem in v tunelih: Botector deluje tudi na pepelasto plesen. |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747      | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha                                                       | ni karence; 6x (7-10 dni)                        |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24                               | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha (najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan; 12x (3 dni)                               | zmanjševanje okužb                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev QST 713                             | Serenade ASO              | 8 L/ha (200 do 1000 L vode na ha)                                   | ni karence; 6x                                   | v razvojnih stadijih od prvega niza cvetovna dnu rozete do polne zrelosti plodov (BBCH 55-89).                                                                                                      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fenheksamid                                                               | Libreto                   | 1,5 L/ha                                                            | 1dan; 3x; 7dni                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | boskalid + piraklostrobin                                                 | Signum                    | 1,8 kg/ha                                                           | 3 dni; 2x (7-14 dni)*                            | dovoljeno največ dvakrat v eni rastni dobi, izmenično z drugimi sredstvi, kot                                                                                                                       |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI | AKTIVNA SNOV                                                                       | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                            | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |                                                                                    |                           |                                    |                           | del fungicidnega programa, v časovnih intervalih 7 - 14 dni                                                                                                                                                                                |
|                     |        | ciprodinil + fludioksonil                                                          | Switch 62,5 WG            | 1 kg /ha                           | 3 dni; 3x 10 dni          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |        | fenheksamid                                                                        | Teldor SC 500,            | 1,5 L/ha                           | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |        | fenpirazamin                                                                       | Prolectus                 | 1,2 kg/ha                          | 1 dan; 3x 7 dni           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |        | <i>Clonostachys rosea</i> sev J1446<br>( <i>Gliocladium catenulatum</i> sev J1446) | Prestop                   | 0,5 % konc                         | 3x v sezoni               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |        | izofetamid                                                                         | Zenby                     | 1,2 L/ha, (400 do 800 L/ha vode)   | 1dan; 2x (7 dni)          | uporaba od začetka cvetenja do spravila pridelka (BBCH 60 - 87)                                                                                                                                                                            |
|                     |        | pirimetanil                                                                        | Pyrus 400 SC              | 2 l/ha                             | 3 dni; 1x                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |        | pirimetanil                                                                        | Scala                     | 2 L/ha                             | 3 dni; večkrat*           | 7 dni na prostem, 7-10 dni zaščiten prostor                                                                                                                                                                                                |
|                     |        | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                                       | Univerzalni fungicid      | 1-2g/3-8 L vode/100 m <sup>2</sup> | 1 dan; na 7 dni           | Tretira se od razvojne faze, ko se začnejo oblikovati stoloni (pritlike): stoloni so vidni (dolgi približno 2 cm), pa do faze polnega cvetenja: sekundarni (B) in terciarni (C) cvetovi so odprti, prvi venčni listi odpadajo (BBCH 41-65) |
|                     |        | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                                       | Polyversum                | 0,1-0,2 kg/ha                      | 1 dan; 4x (7 dni)         | uporaba na prostem (od začetka                                                                                                                                                                                                             |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                               | UKREPI                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV                                                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK       | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      |                           |               |                           | izračanja pritlik do polnega cvetenja - BBCH 41-65)                                                |
| <b>Jagodna pepelasta plesen</b><br><i>(Sphaerotheca macularis (sin. Podosphaera aphanis))</i> , pepelovke iz družine Erysiphaceae | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– zračenje tunelov.</li> </ul> | <i>Ampelomyces quisqualis</i>                                        | AQ-10                     | 70 g/ha       | 1 dan; 2x 87-10 dni)      |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | azoksistrobin                                                        | Mirador 250 SC            | 1 L/ha        | 3 dni; 3x 7 dni           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      | Ortiva                    | 1 L/ha        | 3 dni; 3x 7 dni           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      | Zaftra AZT 250 SC         | 1 L/ha        | 3 dni; 3x 7 dni           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747 | Amylo-X                   | 1,5-2,5 kg/ha | ni karence; 6x (7-10 dni) |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | boskalid + piraklostrobin                                            | Signum                    | 1,8 kg/ha     | 3 dni; 2x (7-14 dni)      |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | difenkonazol                                                         | Mavita 250 EC             | 0,5 L/ha      | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      | Score 250 EC              | 0,5 L/ha      | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | difenokonazol + fluksapiroksad                                       | Sercadis plus             | 0,6 L/ha      | 1 dan; 3x 7 dni           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | kalijev hidrogen karbonat                                            | Vitisan                   | 3 kg/ha       | 1 dan; 8x (7-10 dni)      |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      | Karbicare                 | 3 kg/ha       | 1 dan                     | tretiramo lahko od razvojne faze začetka razvoja listov (BBCH 10) do faze mehčanja jagod (BBCH 85) |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | krezoksim - metil                                                    | Stroby WG                 | 0,3 L/ha      | 7 dni; večkrat (7-14 dni) |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | penkonazol                                                           | Topas 100 EC              | 0,5 L/ha      | 3 dni; 2x 10 dni          |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | žveplo                                                               | Biotip sulfo 800 SC       | 3-5 L/ha      | 7 dni; 4x (7-10 dni)      |                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                      | Thiovit Jet               | 2-4 kg/ha     | 5 dni; 3x (7-21 dni)      |                                                                                                    |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                              | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO        | ODMEREK                                                  | KARENCA dovoljeno št. rab   | OPOMBE                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COS-OGA                              | FYTOSAVE                         | 2 L/ha                                                   | ni karence; 7x (na 7 dni)   | prvo tretiranje preventivno pred pojavom okužbe                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | žveplo                               | Vertipin                         | 6 L/ha (300 do 1000 L vode na ha)                        | 3 dni; 6x (7 dnevni razmak) |                                                                                     |
| <b>Rdeča listna pegavost jagod</b><br><i>(Diplocarpon earliana)</i> in<br><b>Bela listna pegavost jagod</b><br><i>(Mycosphaerella fragariae)</i> | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– ob spomladanskem čiščenju nasada, odstranimo vse odmrle in od bolezni poškodovane dele rastlin,</li> <li>– manjša gostota sajenja.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se zavaruje ob pojavu prvih peg. | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprblau Z 35 WG/WP              | 1,28-1,7 kg/ha; (800 -100 L vode)                        | 3 dni; 2x (7-10 dni)        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Nordox 75 WG                     | 3,3kg/ha                                                 | ČU*, 1x                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Pythium oligandrum</i> M1         | Polyversum, Univerzalni fungicid | 0,1-0,2 kg/ha; (300-800 L vode)                          | 1 dan; 4x (7 dni)           | uporaba na prostem (od začetka izraščanja pritlik do polnega cvetenja - BBCH 41-65) |
| <b>Jagodna koreninska gniloba</b><br><i>(Phytophthora cactorum</i> in <i>P. fragariae)</i>                                                       | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– sajenje zdravega sadilnega materiala,</li> <li>– kolobarjenje,</li> <li>– naprava višjih grebenov, zmerno namakanje.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline zavarujemo ob pojavu bolezni.                  | fosetil – Al                         | Aliette flash                    | 5 kg/ha                                                  | 14 dni; 3x                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Pythium oligandrum</i> M1         | Polyversum, Univerzalni fungicid | 0,05 % konc.; 0,1 do 0,2 kg/ha (200 do 400 L vode na ha) |                             |                                                                                     |
| <b>Črna pegavost jagod</b><br>(Antraknoza)<br><i>(Colletotrichum</i>                                                                             | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uporaba zdravega sadilnega materiala,</li> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> </ul>                                                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprblau Z 35 WG/WP              | 1,5 kg/ha                                                | 3 dni; 4x (7-10 dni)        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | boskalid + piraklostrobin            | Signum                           | 1,8 kg/ha (1000 l vode)                                  | 3 dni; 2x (7-14 dni)        |                                                                                     |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK   | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>acutatum</i><br>in<br><i>Alternaria alternata</i> )                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ob spomladanskem čiščenju nasada, se odstrani vse odmrle in od bolezni poškodovane dele rastlin.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline se škropi ob pojavu bolezni.<br/>Za dobro prezimitev rastlin, je v močno okuženih nasadih nujno jesensko varstvo rastlin.</p> | ciprodinil + fludioksonil            | Switch 62,5 WG            | 1 kg/ha   | 3 dni; 2x (7-14 dni)      |                                                                    |
| Jagodna oglata listna pegavost<br>( <i>Xanthomonas fragariae</i> )<br>(spada med nadzorovane nekarantenska škodljive organizme za sadike jagod - <i>Fragaria</i> ) | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uporaba neokuženega sadilnega materiala,</li> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– dosledno odstranjevanje okuženih delov rastlin iz nasada.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline škropimo ob pojavu bolezni.</p>   | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprblau Z 35 WP/WG       | 1,5 kg/ha | 3 dni; 4x (7-10 dni)      |                                                                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega oksida      | Nordox 75 WG              | 3,3 kg/ha | ČU; 1x                    |                                                                    |
| Jagodov cvetožer<br>( <i>Anthonomus rubi</i> )                                                                                                                     | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izogibanje napravi nasadov neposredni v bližini gozda,</li> <li>– uporaba protiinsektnih mrež.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline škropimo ob pojavu škodljivca.</p>                                                    | ciantraniliprol                      | Benevia                   | 0,75 L/ha | 1 dan                     |                                                                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | deltametrin                          | Decis 100 EC              | 75 mL/ha  | 3 dni                     | tudi za zatiranje listnih uši (Aphididae) in hrčic (Cecidomyiidae) |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                           | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO        | ODMEREK                           | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jajčasti rilčkar</b><br>( <i>Otiorynchus sp.</i> )         | Uporaba entomopatogenih ogorčic.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Za zatiranje ni ustreznih sredstev.                                                                                                                                                                     |                                             |                                  |                                   |                           |                                                                                                                |
| <b>Gosenice in sovke</b><br>(Noctuidae)                       | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>v primeru manjšega napada, se gosenice ročno odstranjuje.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>s kemičnimi sredstvi se škropi le v primeru velikih napadov.                                                                             | <i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i> | Lepinox Plus                     | 1 kg/ha                           | ni karence                |                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Bacillus thuringiensis var. aizawai</i>  | Agree WG                         | 1 kg/ha                           | ni karence                |                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ciantraniliprol                             | Benevia                          | 0,75 L/ha                         | 1 dan                     | ob začetku izleganja sovok (BBCH 12-89) (300-1000 l/ha vode). Deluje na jajčeca in vse razvojne faze gosenice. |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | spinosad                                    | Laser Plus                       | 0,15 L/ha; (200 do 600 l/ha vode) | 1 dan; 3x 7 dni           |                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | emamektin                                   | Affirm                           | 2 kg/ha                           | 1 dan; 3x 7 dni           |                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | azadirachtin A                              | Azatin EC                        | 1,5 L/ha                          | 7 dni; 4x 7-10 dni        |                                                                                                                |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br>( <i>Drosophila suzukii</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– nastavljanje vab,<br>– prekrivanje nasadov s protiinsektnimi mrežami,<br>– redno odstranjevanje napadenih plodov iz nasada in njihovo uničenje,<br>– pogostejše in dosledno obiranje zrelih plodov.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b> | spinosad                                    | Laser Plus                       | 0,15 L/ha; (200 do 600 l/ha vode) | 1 dan; 3x 7 dni           | na prostem in v zavarovanem prostoru                                                                           |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Laser 240 SC                     | 0,3 L/ha; (200 do 600 l/ha vode)  | 1 dan; 3x 7 dni           |                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | deltametrin                                 | Decis trap plodova vinska mušica |                                   | ni karence                | že pripravljena za neposredno uporabo, enakomerno se porazdeli 100 vab na ha                                   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | piretrin                                    | Asset five                       | 0,64 L/ha                         | 2 dni; 3x 7 dni           |                                                                                                                |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                           | UKREPI                                                                                                                                                  | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                    | KARENCA dovoljeno št. rab                                                                             | OPOMBE                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Rastline škropimo ob pojavu škode na plodovih.                                                                                                          |                           |                           |                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| <b>Uši:</b><br><i>Sitobion fragariae</i><br>in<br><i>Myzus ascalonicus</i>    | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>Izogiba se pretiranemu gnojenju z dušikom.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Škropi se, ko opazimo večje populacije uši. | flupiradifuron            | Sivanto prime             | 0,5 L/ha                   | 3 dni; 2x 10 dni                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                                                                                         | pirimikarb                | Pirimor 50 WG             | 0,75 kg/ha                 | 7 dni; 2x (7-14 dni)                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                                                                                         | spirotetramat             | Movento SC 100            | 0,75 L/ha                  | ČU; 2x 14 dni<br><br><b>Zaloge v prodaji do: 30.10.2024</b><br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> | do pojava cvetnih stebel in po obiranju. Na prostem dovoljen za zatiranje pršice, v zavarovanem prostoru pa za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja |
| <b>Navadna, koprivova ali fižolova pršica</b><br><i>(Tetranychus urticae)</i> | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– zračenje tunelov.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Škropi se, ko je presežen prag škodljivosti .                      | abamektin                 | Vertimec pro              | 0,75 L/ha                  | 3 dni; 2x                                                                                             | <b>Zaloge v uporabi do 30.9.2024</b>                                                                                                               |
|                                                                               |                                                                                                                                                         | <i>Beauveria bassiana</i> | Naturalis                 | 1,25 L/ha                  | ni karence;                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                                                                                         | heksitiazoks              | Nissorun 10 WP            | 1 kg/ha                    | 3 dni; 1x                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                                                                                         |                           | Nissorun 250 SC           | 0,32 L/ha; (500 L/ha vode) | 3 dni; 1x                                                                                             | uporaba dovoljena na prostem in v zavarovanem prostoru; uporaba najpozneje ko stari listi odmrejo (do BBCH 97)                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                         | milbemektin               | Milbeknock                | 1,25 L/ha                  | 60 dni; 1x                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| <b>Mehkokožne pršice</b><br><i>(Tarsonemus sp.)</i>                           | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– zračenje tunelov<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Škropimo, ko je presežen prag škodljivosti .                        | spirotetramat             | Movento SC 100            | 1 L/ha                     | ČU; 2x 14 dni<br><br><b>Zaloge v prodaji do:30.10.2024</b><br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b>  |                                                                                                                                                    |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                        | UKREPI                                                                                                                                                                             | AKTIVNA SNOV                        | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                         | KARENCA dovoljeno št. rab                             | OPOMBE                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Resarji<br>( <i>Thrips</i> spp.)                                                           | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– zračenje tunelov.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se škropi takrat, ko se pojavijo prvi znaki poškodb na rastlinah.                    | abamektin                           | Vertimec Pro              | 0,75 L/ha                       | 3 dni; 2x                                             | Zaloge v uporabi do 30.9.2024                                  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | <i>Beauveria bassiana</i>           | Naturalis                 | 1,5 L/ha                        | ni karence;                                           |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | spinosad                            | Laser 240 SC              | 0,45 L/ha                       | 1 dan*; 3x 7dni                                       |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | spinosad                            | Laser Plus                | 0,15 L/ha(200 do 600 l/ha vode) | 1 dan; 3x 7 dni                                       |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | piretrin                            | Asset five                | 0,64 L/ha                       | 3 dni; 3x;7 dni                                       |                                                                |
| Rastlinjakov ščitkar<br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )                               | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– zračenje tunelov.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Škropi se takrat, ko se opazi večji razvoj škodljivca.                                        | <i>Beauveria bassiana</i>           | Naturalis                 | 1,5 L/ha                        | ni karence;                                           |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | <i>Beauveria bassiana</i> , sev GHA | Botanigard OD             | 1,5 L/ha                        | ni karence; 12x                                       | deluje tudi na resarje                                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                     | Botanigard WP             | 0,75 kg/ha                      | ni karence; 12x                                       |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | flupiradifuron                      | Sivanto prime             | 0,625 L/ha                      | 3 dni; 2 x 10 dni                                     |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | spirotetramat                       | Movento SC 100            | 0,75 L/ha                       | ČU*; 2x 14 dni<br><br>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025 | v zaščitenem prostoru do pojava cvetnih stebel in po obiranju. |
| Stenice iz rodu <i>Lygus</i><br><br>marmorirana smrdljivka<br>( <i>Halyomorpha halys</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– zračenje tunelov.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Proti škodljivcem nimamo registriranih sredstev.                                              |                                     |                           |                                 |                                                       |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |                                 |                                                       |                                                                |
| Polži in lazarji                                                                           | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– rastje v okolici nasadov se pogosto kosi, da se polži ne morejo razmnoževati v njem,<br>– v medvrstni prostor se položi zastirko iz agrotekstila. | metaldehid                          | Plantella Arion           | 7-10 kg/ha                      | 21 dni                                                |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                     | Gusto 3-Polžomor          | 6 kg/ha                         |                                                       |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                     | Celaflor Limex            | 140g/100m <sup>2</sup>          | ni omejitev                                           |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                     | Metarex Inov              | 7-10 kg/ha                      | 21 dni                                                |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | železov (III) fosfat                | Položomor bio vaba        | 50kg/ha                         | ni karence, 4x                                        |                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                     | Solabiol proti polžem     | 50kg/ha                         | ni karence, 4x                                        |                                                                |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                          | AKTIVNA SNOV        | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO       | ODMEREK                                             | KARENCA dovoljeno št. rab  | OPOMBE                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Sredstvo proti polžem (vabe) uporabimo takrat, ko nam povzročajo večjo škodo. |                     | Bio Plantela arion proti polžem | 3,8 g/m <sup>2</sup>                                | ni karence; 4 x (7-14 dni) |                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                 |                     | Ferramol                        | 50kg/ha 4x                                          | ni karence, 4x             |                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                 |                     | Naturen bio                     | 3,0 g/m <sup>2</sup>                                | ni karence; 4 x (7-14 dni) |                                                                                                                                                             |
| <b>Pleveli</b>      | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– pletev,<br>– zastiranje tal s folijami.                                 | kletodim            | Select super                    | 1 L/ha; 2 L/ha (plazeča pirnica); (200 do 400 l/ha) | 30 dni                     |                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                 | klopiralid          | Clap                            | 0,4L/ha                                             | ČU; 3x                     | Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsake tri leta                                                                                               |
|                     |                                                                                                                 |                     | Clap forte                      | 0,167 L/ha                                          | ČU, 1x                     |                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                 | pelargonska kislina | Beloukha                        | 16 L/ha                                             | ČU; 2x na 7 dni            | Tretira se medvrstni prostor po vzniku posevka ali po presajanju sadik gojenih rastlin, vse do spravila pridelka (BBCH 10-97), ob obvezni uporabi ščitnikov |
|                     |                                                                                                                 | izoksaben           | Flexidor                        | 0,25 L/ha                                           | 1 ČU, 1x                   | na prostem                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                                 | pendimetalin        | Stomp Aqua                      | 2,9 L/ha                                            | ČU                         |                                                                                                                                                             |

#### 11.8 INTEGRIRANO VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                             | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                   |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|
|                     | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> | ciprodinil + fludioksonil | Switch 62,5 WG            | 1 kg/ha | 10 dni; 3x na 10 dni      | delno deluje na monilijo |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                        |                 |                          |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Siva plesen ali gniloba</b><br><i>(Botryotinia fuckeliana)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– zmerno gnojenje z dušikom,</li> <li>– vzdrževanje zračnega grma z ustrezno rezjo.</li> </ul> <p><b>Kemično varstvo:</b><br/>Škropimo v cvet in plod pred dežjem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fenheksamid                                                               | Teldor SC 500          | 2 L/ha          | 3 dni; 4x na 7-14 dni    |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | boskalid, piraklostrobin                                                  | Signum                 | 1 kg/ha         | 7 dni; 2x na 7-10 dni    |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Aureobasidium pullulans</i> (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) | Botector               | 1 kg/ha         | 1 dan; 6x na 2 dni       |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. plantarum, sev D747              | Amylo - X              | 1,5-2,5kg/ha    | ni karence; 6x; 7-10 dni |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former subtilis) str. QST 713          | Serenade Aso           | 8 L/ha          | ni karence; 6x           |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24                               | Taegro                 | 0,185-037 kg/ha | 1 dan; 10x (7dni)        | zmanjševanje okužb                                  |
| <b>Monilija</b><br><i>(Monilinia vaccinii-corymbosi)</i>          | <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– izrezovanje okuženih poganjkov,</li> <li>– zatiranje apotecijev v tleh z mehanskimi in kemičnimi metodami (koncentrirana urea, zelena galica),</li> <li>– pobiranje in odstranjevanje okuženih plodov iz nasada.</li> </ul> <p><b>Kemično varstvo:</b><br/>Poudarek je na preprečevanju prve okužbe poganjkov.<br/><u>Za preprečevanje cvetnih okužb z monilijo borovnic v Sloveniji nimamo registriranih namenskih fungicidov.</u><br/><u>Sredstva, ki so namenjena zatiranju sive plesni, hkrati učinkovito delujejo</u></p> | bakrov oksiklorid                                                         | Cuprblau Z 35 WG in WP | 2 do 3 kg/ha    | ČU; 3x (7-10 dni)        | škropljenje spomladi pred cvetenjem ali po obiranju |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                        |                 |                          |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | difenkonazol                                                              | Mavita 250 EC          | 0,5 L/ha        | 3 dni; 2x 7 dni          |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Score 250 EC           | 0,5 L/ha        | 3 dni; 2x 7 dni          |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tebukonazol                                                               | Folicur EW 250         | 0,8 L/ha        | ČU; 1x                   | uporabljamo pred cvetenjem                          |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                        |                 |                          |                                                     |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                         |              |                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | tudi proti cvetim okužbam z monilijo borovnic.                                                                                                                                                                          |                                      |                         |              |                       |                                                                                                                                                                  |
| <b>Antraknoza</b><br>( <i>Colletotrichum acutatum</i> )                                                    | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– optimalno namakanje,</li> <li>– hlajenje plodov neposredno po obiranju.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline škropimo ob pojavu bolezni. | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WG in WP | 2 do 3 kg/ha | ČU; 3x (7-10 dni)     | škropljenje spomladi pred cvetenjem ali po obiranju                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | boskalid+ piraklostrobin             | Signum                  | 1,0 kg/ha    | 7 dni; 2x (7-10 dni)  |                                                                                                                                                                  |
| <b>Pepelovke</b><br>( <i>Microsphaera vaccinii</i> , <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> , <i>Erysiphe</i> spp.) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>Izogibamo se pretiranemu gnojenju z dušikom.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se škropi takrat, ko se pojavi škoda.                                                            | kalijev hidrogen karbonat            | Vitisan                 | 5 kg/ha      | 1 dan; 8x (7-10 dni)  |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | krezoksim - metil                    | Stroby WG               | 0,2 kg/ha    | 21 dni, 3x 10-14 dni  | od fenološke faze pojava socvetja do fenološke faze barvanja jagod (BBCH 51-85)                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | žveplo                               | Biotip Sulfo 800 SC     | 3-5 L/ha     | 7 dni; 4x (7-10 dni)* | stransko delovanje vseh sredstev na pršice in sesajoče žuželke.                                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Thiovit Jet             | 4-5 kg/ha    | 7 dni; 4x             |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Microthiol special      | 7 kg/ha      | 7 dni; 6x (7-14 dni)  | v razvojni fazi, ko so prvi cvetni brsti ločeni na podaljšanem grozdu, do faze nadaljevanja dozorevanja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 57-85) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Microthiol disperss     | 7 kg/ha      | 7 dni; 6x (7-14 dni)  | v razvojni fazi, ko so prvi cvetni brsti ločeni na podaljšanem grozdu, do faze                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                         |                            |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                         |                            |              |                                  | nadaljevanja<br>dozorevanja:<br>intenzivnost sortno<br>značilnih barv<br>narašča (BBCH<br>57-85)                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                         | Sulfar                     | 7 kg/ha      | 7 dni; 6x (7-14<br>dni)          | v razvojni fazi, ko<br>so prvi cvetni brsti<br>ločeni na<br>podaljšanem<br>grozdu, do faze<br>nadaljevanja<br>dozorevanja:<br>intenzivnost sortno<br>značilnih barv<br>narašča (BBCH<br>57-85). Sredstvo<br>ima stransko<br>delovanje na<br>pršice. |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | COS-OGA                                 | FYTOSAVE                   | 2 L/ha       | ni karence; 5x (7<br>dni-10 dni) | za delno<br>zmanjševanje<br>okužb s<br>pepelovkami iz<br>družine<br>Erysiphaceae                                                                                                                                                                    |
| <b>Listne pegavosti</b><br>( <i>Mycosphaerella</i><br>spp., <i>Colletotrichum</i><br><i>acutatum</i> , <i>Septoria</i> )<br><b>Bakterijska</b><br><b>pegavost</b><br>( <i>Pseudomonas</i> spp.) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>Izogiba se se pretiranemu gnojenju z<br>dušikom.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Rastline se škropi v času mirovanja<br>ali na začetku pomladi. | baker v obliki<br>bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WG in<br>WP | 2 do 3 kg/ha | ČU; 3x (7-10 dni)                | škropljenje<br>spomladi pred<br>cvetenjem ali po<br>obiranju                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rak stebila</b><br>( <i>Botryosphaeria</i><br><i>corticis</i> )                                                                                                                              | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– sajenje odpornejših sort,<br>– izrezovanje okuženih<br>poganjkov.                                                                                      |                                         |                            |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odmiranje stebel</b>                                                                                                                                                                         | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b>                                                                                                                                                             | bakrov oksiklorid                       | Cuprablau Z 35 WG in       | 2 do 3 kg/ha | ČU; 3x (7-10 dni)                |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ( <i>Fusicoccum putrefaciens</i> ( <i>Godronia cassandrae</i> f. sp. <i>vaccinii</i> )) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– izrezovanje okuženih poganjkov.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline se škropi v času mirovanja ali na začetku pomladi.</p>                                                                                                      |                                      | Cuprablau Z 35 WP                      |                                      |                    | škropljenje spomladi pred cvetenjem ali po obiranju            |
| <b>Sušenje vej</b><br><i>Phomopsis vaccinii</i> ( <i>Diaporthe vaccinii</i> )           | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– izrezovanje okuženih poganjkov.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline se škropi v času mirovanja ali na začetku pomladi.</p>                                                            | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WG in Cuprablau Z 35 WP | 2 do 3 kg/ha                         | ČU; 3x (7-10 dni)  | škropljenje spomladi pred cvetenjem ali po obiranju            |
| <b>Koreninska gniloba</b><br>( <i>Phytophthora</i> sp., <i>Phytophthora cinnamomi</i> ) | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– sajenje na odcedne lege ali na višje grebene.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline se škropi v času mirovanja ali na začetku pomladi.<br/>Smiselno je samo preventivno tretiranje.</p> | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WG in Cuprablau Z 35 WP | 2 do 3 kg/ha (500 do 1000 L/ha vode) | ČU; 3x (7-10 dni)  | škropljenje spomladi pred cvetenjem ali po obiranju            |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |                                      |                    |                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |                                      |                    |                                                                |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br><i>Drosophila suzukii</i>                               | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nastavljanje vab,</li> <li>– prekrivanje s protiinsektnimi mrežami,</li> <li>– sajenje zgodnejših sort,</li> <li>– pogostejše in dosledno obiranje</li> </ul>                                                                                    | spinosad (spinosin A+spinosin D)     | Laser 240 SC                           | 0,4 L/ha                             | 3 dni; 2x 7 dni    |                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | spinosad (spinosin A+spinosin D)     | Laser Plus                             | 0,2 L/ha                             | 3 dni; 2x na 7 dni |                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | piretrin                             | Asset five                             | 0,51 L/ha                            | 2 dni; 3x na 7 dni |                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | deltametrin                          | Decis trap plodova vinska mušica       | 100 vab na ha                        | ni karence         | že pripravljena za neposredno uporabo, enakomerno se porazdeli |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                   |                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– obiranje napadenih plodov in njihovo odstranjevanje iz nasada.</li> </ul> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rastline se škropi takrat, ko se pojavijo prve mušice,</li> <li>– priporočeno je škropljenje v večernih urah ali ponoči.</li> </ul> | ciantraniliprol       | Exirel           | 0,75 L na ha      | 3 dni; 2x na 3 dni                                          | Dovoljenje za nujne primere veljavno do 1.10.2024                                                                                                                                          |
| <b>Hrčica</b><br>( <i>Dasineura oxycoccana</i> ) | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nastavlja se rumene lepljive plošče,</li> <li>– večkratna plitva obdelava tal pod grmi.</li> </ul>                                                                                                                                                 |                       |                  |                   |                                                             | Na hrčico delno vpliva škropljenje s sredstvi na osnovi žvepla.                                                                                                                            |
| <b>Listne uši</b><br>(Aphididae)                 | <p><b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br/>Izogiba se pretiranemu gnojenju z dušikom.</p> <p><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br/>Rastline se škropi takrat, ko se pojavi škoda.</p>                                                                                                                                                     | pirimikarb            | Pirimor 50 WG    | 0,5 kg/ha         | 7 dni; 2x (7-14 dni)                                        | upoštevati 20 m neškropljen varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.                                                                                              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | spirotetramat         | Movento SC 100   | 0,75 L/ha         | ČU; 2x 14 dni<br><br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> |                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | olje navadne ogrščice | Celaflor Naturen | 2 % koncentracija | ni karence; večkrat (7-10 dni)                              | Zmanjšuje populacije listnih uši (Aphididae), ščitkarjev (Aleyrodidae), kaparjev (Cocina) in gibljivih stadijev pršic prelka (Tertranychidae). Uporaba, ko so temperature zraka pod 25 °C. |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | parafinsko olje       | Ovitex           | 20 L/ha           | ni karence; 1x                                              | Deluje tudi na kaparje                                                                                                                                                                     |

|                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                   |                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                   |                                                             | (Coccoidae) in pršice (Acardiae)                                                                                                                                                          |
| Kaparji<br>(Coccoidea)                                  | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>izrezovanje starega lesa.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se škropi takrat, ko se pojavi škoda.                            | parafinsko olje                                                                                                                                         | Ovitex           | 20 L/ha           | ni karence; 1x                                              | deluje tudi na listne uši (Aphididae) in pršice (Acardiae)                                                                                                                                |
|                                                         |                                                                                                                                                                      | spirotetramat                                                                                                                                           | Movento SC 100   | 0,75 L/ha         | ČU; 2x 14 dni<br><br><b>Zaloge v uporabi do: 30.10.2025</b> |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                                                      | olje navadne ogrščice                                                                                                                                   | Celaflor Naturen | 2 % koncentracija | ni karence; večkrat (7-10 dni)                              | zmanjšuje populacije listnih uši (Aphididae), ščitkarjev (Aleyrodidae), kaparjev (Cocina) in gibljivih stadijev pršic prelk (Tertranychidae). Uporaba, ko so temperature zraka pod 25 °C. |
| Gosenice škodljivih metuljev<br><i>Lepidoptera</i> spp. | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>odstranjevanje zapredkov.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Škropljenje se opravi, ko se izležejo prve gosenice.                      | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>                                                                                                       | Agree WG         | 1 kg/ha           | ni karence; 3x 7 dni                                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                                                      | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>                                                                                                      | Lepinox Plus     | 1 kg/ha           | ni karence; 7-10 dni                                        |                                                                                                                                                                                           |
| Pleveli                                                 | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pletev,</li> <li>– zastiranje s folijami,</li> <li>– zastiranje z žaganjem iglavcev.</li> </ul> | pelargonska kislina                                                                                                                                     | Beloukha         | 16 L/ha           | ČU; 2x (2-7 dni)                                            | Uporaba je dovoljena le v vrsti in v pasu. Najvišji dovoljen odmerek sredstva pri tretiranju v pasovih je 10,67 L/ha.                                                                     |
|                                                         |                                                                                                                                                                      | pendimetalin                                                                                                                                            | Stomp Aqua       | 2,9 l/ha          | ČU; 1x                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                                                      | Sredstva ni dovoljeno uporabljati na tleh z deležem organske snovi nad 6% (močvirska/šotna tla) ter zelo lahkih tleh (peščena, prodnata in kamnita tla) |                  |                   |                                                             |                                                                                                                                                                                           |

# 11.9 INTEGRIRANO VARSTVO MALIN

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                          | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV                                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                 | KARENCA dovoljeno št. rab   | OPOMBE                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Siva plesen ali gniloba<br>( <i>Botriotinia fuckeliana</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– zmerno gnojenje z dušikom,</li> <li>– vzdrževanje zračnega grma,</li> <li>– pridelovanje v zavarovanem prostoru.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se škropi v začetku cvetenja ter ob pojavu bolezni na plodovih. | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>                                         | Serenade ASO              | 8 L/ha, 1,5 - 2,5 kg/ha | ni potrebna; 6x             | uporaba do barvanja plodov                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24                               | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha        | 1 dan; 10x na 7dni          | zmanjševanje okužb, stransko delovanje na pepelovke       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747      | Amylo - X                 | 1,5-2,5 kg/ha           | ni potrebna; 6x na 7-10 dni | zmanjševanje okužb, na prostem in v zavarovanih prostorih |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Aureobasidium pullulans</i> (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) | Botector                  | 1 kg/ha                 | 1 dan; 6x na 2 dni          |                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | boskalid+ piraklostrobin                                                  | Signum                    | 1,0 kg/ha               | 7 dni; 2x na 7-10 dni       | deluje tudi na malinovo sušico                            |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ciprodinil-fludioksonil                                                   | Switch 62,5 WG            | 1 kg/ha                 | 10 dni; 2x na 10 dni        |                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fenheksamid                                                               | Teldor SC 500             | 1,5 L/ha                | 7 dni; 4x na 7-10 dni       |                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pirimetanil                                                               | Pyrus 400 SC              | 2 L/ha                  | 7 dni; 2x                   |                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pirimetanil                                                               | Scala                     | 2 L/ha                  | 3 dni                       | uporaba do začetka cvetenja (10 % odprtih cvetov).        |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                             | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK        | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malinova sušica</b><br><i>(Didymella applanate)</i><br><i>(Leptosphaeria coniothyrium)</i>                                                                                                                                                   | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– vzdrževanje zračnega grma (prava gostota poganjkov in odstranjevanje plevelov),</li> <li>– rez starih rodnih poganjkov po obiranju,</li> <li>– odrezane poganjke se odstrani iz nasada in sežge,</li> <li>– uravnoteženo gnojenje.</li> </ul> <b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Bolezen se zatira od pomladi do začetka zorenja in po obiranju. | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprablau Z 35 WG         | 1,28-1,7 kg/ha | ČU; 2x (7-10 dni)         | Na malinovo sušico delujejo tudi listna gnojila z večjo količino bakra. |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | boskalid+ piraklostrobin             | Signum                    | 1,0 kg/ha      | 7 dni; 2x (7-10 dni)      |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | difenokonazol                        | Difenzone                 | 0,4 L/ha       | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Mavita 250 EC             | 0,4 L/ha       | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Score 250 EC              | 0,4 L/ha       | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                         |
| <b>Malinova rja</b><br><i>(Phragmidium rubi-idea)</i>                                                                                                                                                                                           | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>zračen sklop rastlin.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Škropimo pred cvetenjem ali po obiranju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | difenokonazol                        | Difenzione                | 0,4 L/ha       | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Mavita 250 EC             | 0,4 L/ha       | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Score 250 EC              | 0,4 L/ha       | 3 dni; 2x 7 dni           |                                                                         |
| <b>Koreninska gniloba</b><br><i>(Phytophthora fragariae var. rubi)</i><br>in <b>druge talne glive</b> ,<br>kot so <i>Fusarium</i> ,<br><i>Verticillium</i> ,<br><i>Plasmodiophora</i> ,<br><i>Rhizoctonia</i> ,<br><i>Phytophthora</i> in druge | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornejših sort,</li> <li>– zdrav sadilni material,</li> <li>– sajenje na odcedne lege,</li> <li>– sajenje na grebene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                |                           |                                                                         |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                              | UKREPI                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                           | KARENCA dovoljeno št. rab       | OPOMBE                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pepelovke</b><br><i>(Erysiphe spp.)</i><br>iz družine<br>Erysiphaceae<br><i>(Sphaerotheca mors-uvae, Podosphaera aphanis)</i> | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustrezno zračenje tunelov,</li> <li>– redčenje gram z izrezovanjem poganjkov do tal.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Škropi se ob pojavu bolezni. | izolat M-10 glive<br><i>Ampelomyces quisqualis</i>                       | AQ-10                     | 70 g/ha                           | 1 dan; 2x na 7-10 dni           |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | kalijev hidrogen karbonat                                                | Karbicure                 | 5 kg/ha (500 - 1000 L vode na ha) | 1 dan; 8x                       |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747     | Amylo - X                 | 1,5-2,5kg/ha                      | ni potrebna; 6x na 7-10 dni     | Amylo – X: zmanjševanje okužb na prostem in v zavarovanih prostorih                                                 |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | žveplo                                                                   | Thiovit jet               | 4-7 kg/ha                         | 7 dni; 4x na 7-14 dni           |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | kalijev hidrogen karbonat                                                | Vitisan                   | 5 kg/ha                           | 1 dan; 8x na 7-10 dni           | od faze mišjih ušes (BBCH 03) do odpadanja listov (BBCH 93)                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | difenokonazol                                                            | Score 250 EC              | 0,4 L/ha                          | 3 dni; 2x na 7 dni              |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | Mavita 250 EC             | 0,4 L/ha                          | 3 dni; 2x na 7 dni              |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | žveplo                                                                   | Biotip Sulfo 800 SC       | 3-5 L/ha                          | 7 dni; 4x na 7-10 dni           | <b>Žveplo</b> deluje tudi na pršice in sesajoče žuželke.<br><br>Tretiranje, ko so temperature zraka med 15 in 25 °C |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | COS-OGA                                                                  | Fytosave                  | 2 L/ha                            | ni karence; 5x na 7 dni         |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | Microthiol disperss       | 7,0 kg/ha                         | 7 dni; 6x na 14 dni             |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                           | 4,0-5,0 L/ha                      | 7 dni; 6x na 14 dni             |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                           | 7 kg/ha                           | 7 dni; 6x na 7-14 dni           |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | Sulfar                    | 7 kg/ha                           | 7 dni; 6x na 7-14 dni           |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713 | Serenade aso              | 8 L/ha                            | ni karence; do 6x v rastni dobi | tudi za sivo plesen, tretiranje v razvojnih stadijih od nabrekanja cvetnih                                          |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNA SNOV                                                    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK        | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                           |                |                           | brstov do nadaljevanja barvanja plodov (BBCH 51-85) |
| <b>Pegavosti</b><br>( <i>Mycosphaerella rubi</i> )                | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustrezno zračenje tunelov,</li> <li>– redčenje gram z izrezovanjem poganjkov do tal.</li> </ul> <b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Škropi se ob pojavu bolezni. | baker v obliki bakrovega oksiklorida                            | Cuprablau Z 35 WG         | 1,28-1,7 kg/ha | ČU; 2x na 7-10 dni        |                                                     |
| <b>Jagodov cvetožer</b><br>( <i>Anthonomus rubi</i> )             | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>Izogiba se napravi nasadov v neposredni bližini gozda.                                                                                                                                               |                                                                 |                           |                |                           |                                                     |
| <b>Malinar ali malinov hrošč</b><br>( <i>Byturus tomentosus</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obešanje lepljivih plošč,</li> <li>– izobešanje feromonskih pasti v posebnih lovilnih posodah.</li> </ul>                                                      |                                                                 |                           |                |                           |                                                     |
| <b>Gosenice škodljivih metuljev</b><br>( <i>Lepidoptera</i> spp.) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>Odstranjevanje zapredkov.<br><br><b><u>Kemično varstvo:</u></b><br>Škropljenje se opravi, ko se izležejo prve gosenice. Škropi se le ob večjem pojavu škodljivca.                                    | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>               | Agree WG                  | 1 kg/ha        | ni potrebna               |                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> sev EG2348 | Lepinox plus              | 1 kg/ha        | ni potrebna               |                                                     |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                           | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV                     | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO        | ODMEREK   | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malinova hrčica</b><br>( <i>Rosseliella theobaldi</i> )    | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izrezovanje in zažiganje napadenih poganjkov,</li> <li>– obešanje lepljivih plošč,</li> <li>– feromonske vabe.</li> </ul>                                               |                                  |                                  |           |                           | Feromonske vabe z lepljivo ploščo.                                                                      |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br>( <i>Drosophila suzukii</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ulov na prehranske vabe,</li> <li>– prekrivanje s protiinsektnimi mrežami.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se škropi takrat, ko se pojavijo prve mušice. | spinosad (spinosin A+spinosin D) | Laser 240 SC                     | 0,4 L/ha  | 3 dni; 2x na 10 dni       |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Laser Plus                       | 0,2 L/ha  | 3 dni; 2x na 10 dni       |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | piretrin                         | Asset five                       | 0,51 L/ha | 2 dni; 3x na 7 dni        |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | deltametrin                      | Decis trap plodova vinska mušica |           | ni potrebna               | že pripravljena za neposredno uporabo, enakomerno se porazdeli 100 vab na ha                            |
| <b>Navadna pršica</b><br>( <i>Tetranychus urticae</i> )       | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustrezna rez (redok sklop rastlin),</li> <li>– zračenje tunelov.</li> </ul> <b>Kemično varstvo:</b><br>Rastline se tretira ob pojavu škodljivca.                        | acekvinocil                      | Kanemite SC                      | 1,25 L/ha | ČU; 1x                    | Zatiranje pršic šiškaric (Eriophyidae). Tretiranje je dovoljeno le po končanem obiranju malin in robid. |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Beauveria bassiana</i>        | Naturalis                        | 1,5 L/ha  | ni karence;               |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | žveplo                           | Microthiol special               | 7 kg/ha   | 7 dni; 6x na 14 dni       |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Microthiol desperss              | 7 kg/ha   | 7 dni; 6x na 14 dni       |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Microthiol SC                    | 4-5 L/ha  | 7 dni; 6x na 14 dni       |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Sulfar                           | 7 kg/ha   | 7 dni; 6x na 7-14 dni     |                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | parafinsko olje                  | Ovitex                           | 20 L/ha   | ni potrebna; 1x           |                                                                                                         |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                         | UKREPI                                                                                                                                                                                          | AKTIVNA SNOV                               | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                                              | ODMEREK                                            | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | olje navadne ogrščice                      | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat | 2%                                                 | ni potrebna; 3x           | Celaflor, deluje na giblјive stadije                                                                                                   |
| Listne uši<br>( <i>Aphididae</i> )                                                                          | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>Zmerno gnojenje z dušikom.<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>Škropi se takrat, ko se opazi večjo populacijo uši.                                                 | <i>Beauveria bassiana</i> , soj ATCC 74040 | Naturalis                                                                              | 1,5 L/ha                                           | ni potrebna;              |                                                                                                                                        |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | olje navadne ogrščice                      | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat | 2%                                                 | ni potrebna; 3x           | zmanjševanje populacije                                                                                                                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | parafinsko olje                            | Ovitex                                                                                 | 20 L/ha                                            | ni potrebna; 1x           |                                                                                                                                        |
| Ščitkarji:<br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ,<br><i>Bemisia tabaci</i><br><i>Bemisia argentifoli</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>Zračenje tunelov.                                                                                                                                                | <i>Beauveria bassiana</i> , sev GHA        | Botanigard WP                                                                          | 0,75 kg/ha                                         | ni potrebna; 12x          | za nasade na prostem.                                                                                                                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | olje navadne ogrščice                      | Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline - koncentrat | 2%                                                 | ni potrebna; 3x           | zmanjševanje populacije                                                                                                                |
| Pleveli                                                                                                     | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje rastlin na agrotekstil ali polietilensko folijo,</li> <li>– plitvo okopavanje,</li> <li>– ročna pletev.</li> </ul> | glifosat v obliki izopropilamino soli      | Tajfun 360                                                                             | 20-80 mL/100 m <sup>2</sup> (100-300 l vode na ha) | 7 dni; 2x (30 dni)        |                                                                                                                                        |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | pelargonska kislina                        | Beloukha                                                                               | 16 L/ha                                            | ČU; 2x (na 2-7 dni)       | Uporaba sredstva Beloukha je dovoljena le v vrsti in v pasu. Najvišji dovoljen odmerek sredstva pri tretiranju v pasovih je 10,67 L/ha |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | pendimetalin                               | Stomp aqua                                                                             | 2,9 L/ha                                           |                           | Tretira se nezapleveljena tla, v času od spravila pridelka do začetka brstenja spomladi.                                               |

# 11.10 INTEGRIRANO VARSTVO OREHA

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                    | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK         | KARENCA dovoljeno št. rab           | OPOMBE                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orehova črna listna pegavost<br>( <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sadi se pozne sorte, ki so navadno manj občutljive,</li> <li>– z rezjo se skrbi za odprto in zračno krošnj,</li> <li>– zimsko dognojevanje s P- in K- gnojili se opravi jeseni,</li> <li>– napadene dele drevesa se zažge.</li> </ul> <b>Kemično varstvo</b> se izvaja šele, ko se pojavijo prvi simptomi bolezni. Ker je raba FFS omejena predvsem na jesensko zimski čas, v dobi rasti se uporablja listna gnojila z večjim deležem bakra. | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha   | ČU 2XL (7-10 dnevni razmak)         | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata | Cuproxat                  | 2,6 do 7,9 L/ha | 14 dni 3XL (v 14 dnevni intervalih) | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesenskozimskem času.                                                          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WP         | 2 kg/ha         | ČU 3XL (v 14 dnevni intervalih)     | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesensko zimskem času.                                                         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Cuprablau Z 50 WP         | 2,4 kg/ha       |                                     |                                                                                                            |
| bakterijske bolezni iz rodov <i>Xanthomonas</i> spp.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha   | ČU 2XL (7-10 dnevni razmak)         | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata | Cuproxat                  | 2,6 do 7,9 L/ha | 14 dni 3XL (v 14 dnevni intervalih) | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesenskozimskem času.                                                          |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                         | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK   | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rjava apikalna nekroza orehov</b><br>(ang. BAN, brown apical necrosis)                                   | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odstranjuje se mumificirane plodove,</li> <li>– redno se apni zakisana tla,</li> <li>– skrbi se za dobro prehranjenost dreves - predvsem s fosforjem, kalcijem, manganom in magnezijem.</li> </ul>                                                                    | boskalid + piraklostrobin | Signum                    | 1,0 kg/ha | 28 dni 2XL                | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranjmi naj bo 10-15 dni. |
| <b>Rjava orehova pegavost</b><br>( <i>Ophiognomonia leptostyla</i> )                                        | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sadi se manj občutljive sorte,</li> <li>– izbira se zračne lokacije,</li> <li>– oblikuje se odprte in zračne krošnje,</li> <li>– skrbi se za dobro prehranjenost dreves,</li> <li>– jeseni se pograbi in zažge okuženo listje in plodove.</li> </ul>                  | boskalid + piraklostrobin | Signum                    | 1,0 kg/ha | 28 dni 2XL                | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranjmi naj bo 10-15 dni. |
| <b>Gniloba in trohnoba korenin in krošnje</b><br>(glive iz rodov <i>Armillaria</i> in <i>Phytophthora</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje zdravih sadik,</li> <li>– naprava nasada na očiščenih zemljiščih brez ostankov korenin izkrčenih dreves,</li> <li>– izogibanje zemljiščem z visoko podtalnico in preprečevanje zastajanja vode (zlasti okrog debel) s talno in površinsko drenažo.</li> </ul> |                           |                           |           |                           |                                                                    |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                  | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                | AKTIVNA SNOV                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK         | KARENCA dovoljeno št. rab           | OPOMBE                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rak skorje:</b><br>globinski rak skorje (bakterija <i>Erwinia rubrifaciens</i> ) in površinski rak skorje (bakterija <i>Erwinia nigrifluens</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izbira rastišča z dobrim vodnim režimom,</li> <li>– skrb za dobro kondicijo in bujno rast dreves in zadostna oskrba z vodo spomladi in poleti.</li> </ul> |                                                |                           |                 |                                     |                                                                                                            |
| <b>bakterijske</b> bolezni iz rodov <i>Pseudomonas</i> spp.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha   | ČU 2XL (7-10 dnevni razmak)         | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata | Cuproxat                  | 2,6 do 7,9 L/ha | 14 dni 3XL (v 14 dnevni intervalih) | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesenskozimskem času.                                                          |
| <b>glive iz rodu</b> <i>Alternaria</i> spp.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | boskalid + piraklostrobin                      | Signum                    | 1,0 kg/ha       | 28 dni 2XL                          | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranjmi naj bo 10-15 dni.                                         |
| <b>glive iz rodu</b> <i>Cladosporium</i> spp.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | boskalid + piraklostrobin                      | Signum                    | 1,0 kg/ha       | 28 dni 2XL                          |                                                                                                            |
| <b>glive iz rodu</b> <i>Colletotrichum</i> spp.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | boskalid + piraklostrobin                      | Signum                    | 1,0 kg/ha       | 28 dni 2XL                          |                                                                                                            |
| <b>glive iz rodu</b> <i>Fusarium</i> spp.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | boskalid + piraklostrobin                      | Signum                    | 1,0 kg/ha       | 28 dni 2XL                          |                                                                                                            |





| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                            | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNA SNOV                       | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                                                                      | ODMEREK            | KARENCA dovoljeno št. rab      | OPOMBE                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | služi kot začetni datum za enega izmed modelov napovedovanja škodljivosti jabolčnega zavijača. |                    |                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Orehova muha<br>( <i>Rhagoletis completa</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– redna rez dreves in skrb za dobro osvetlitev krošnje,</li> <li>– plitva jesenska ali spomladanska obdelava tal pod drevesi,</li> <li>– odstraniti in zažgati počrnele odpadle plodove z žerkami,</li> <li>– prekrivanje tal pod krošnjami oreha: čvrsto pritrditi ponjavo iz tekstila ali vrtno kopreno (tla naj bodo prekrita od začetka julija do konca avgusta; ukrep je primeren za posamezna drevesa, zlasti v naseljih).</li> </ul> | deltametrin                        | Decis trap orehova muha                                                                        | 50 do 100 pasti/ha | zagotovljena z načinom uporabe | Pasti učinkovito delujejo do 150 dni.                                                                                                                                                                        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | spinosad (spinosin A + spinosin D) | Laser 240 SC                                                                                   | max 0,15 L/ha      | 30 dni 3XL                     | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Škropilni brozgi se doda ustrezen prehranski atraktant (Nutrel) skladno z navodilom za uporabo, ki služi kot vaba za orehovo muho. <b>Tretira se le tretjino drevesne krošnje.</b> |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Laser plus                                                                                     | max 0,075 L/ha     |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | <b>Kemično varstvo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spremljanje leta muhe s pomočjo rumenih lepljivih plošč, skupaj z atraktantom (obesi se jih sredi julija v senčne dele krošenj, eno na višino 2 m, drugo v zgornjo polovico krošnje; spremlja se vse do začetka septembra),</li> <li>• ob prvem ulovu orehove muhe tretjino se drevesne krošnje poškrapi s</li> </ul>                                                                                                                         |                                    |                                                                                                |                    |                                |                                                                                                                                                                                                              |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UKREPI                                                                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                 | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pripravkom Laser 240 SC + Nutrel ali Laser plus + Nutrel ter ponovno čez 7-14 dni.                                                                                                        |                 |                           |                         |                           |                                                                                                 |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Izmenično mulčenje nasada po pasovih, da se stenice zadržijo na nepokošenih travah in zeleh.                                                                                              | deltametrin     | Decis 100 EC              | 75 mL/ha                | 30 dni                    | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Na istem zemljišču tretira <b>največ enkrat</b> v eni rastni sezoni.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                 | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                |                           | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Na istem zemljišču tretira <b>največ dvakrat</b> v eni rastni sezoni. |
| <b>Uši</b> (Aphididae): velika orehova listna uš ( <i>Panaphis juglandis</i> ), mala orehova listna uš ( <i>Chromaphis juglandicola</i> ), <b>kaparji</b> (Coccoidae), <b>pršice</b> (Acardiae): orehova pršica ( <i>Phyllocoptes unguiculatus</i> ), orehova mehurjasta pršica ( <i>Eriophyes tristriata</i> , <i>Eriophyes tristrata erineae</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– naseljevanje naravnih sovražnikov,</li> <li>– pri mladih orehih močno napadene liste potrgamo in zažgemo.</li> </ul> | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 L/ha ali 2 x 10 L/ha | ni potrebna               | Zimsko ali pred pomladansko tretiranje, <b>pred začetkom vegetacije.</b>                        |

## 11.11 INTEGRIRANO VARSTVO LESKE

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                    | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK         | KARENCA dovoljeno št. rab              | OPOMBE                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bakterijski ožig leske</b><br>( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– sajenje zdravega materiala,<br>– izrezovanje obolelih poganjkov,<br>– razkuževanje škarij pred rezjo in po njej,<br>– zgodnje uničevanje koreninskih izrastkov s herbicidi,<br>– natančno opazovanje rastlin,<br>– sistematično krčenje okuženih matičnih rastlin v drevesnicah,<br>– skrb za dobro kondicijo rastlin in ustrezna prehrana. | boskalid + piraklostrobin                      | Signum                    | 1,0 kg/ha       | 28 dni 2XL                             | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranji naj bo 10-15 dni.                                                                                              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha   | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnom razmaku)     | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.                                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata | Cuproxat                  | 3,6 do 6,6 L/ha | 14 dni 3XL<br>(v 14 dnevni intervalih) | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesenskozimskem času.                                                                                                              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WP         | 2 kg/ha         | ČU 2XL                                 | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni po pravilu pridelka in odpadanju listja. |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | Cuprablau Z 50 WP         | 2,4 kg/ha       |                                        |                                                                                                                                                                |
| <b>Bakterijske bolezni iz rodov</b><br><i>Xanthomonas</i> spp.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha   | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnom razmaku)     | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.                                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata | Cuproxat                  | 3,6 do 6,6 L/ha | 14 dni 3XL                             | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesenskozimskem času.                                                                                                              |
| <b>Bakterijski rak leske</b><br>( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i> )   | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– sajenje zdravih sadik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | baker v obliki bakrovega oksiklorida           | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha   | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnom razmaku)     | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.                                                     |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                 | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNA SNOV                                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                  | KARENCA dovoljeno št. rab           | OPOMBE                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– uporaba herbicidov za uničevanje koreninskih izrastkov,</li> <li>– čim manj rezi,</li> <li>– razkuževanje škarij,</li> <li>– natančno opazovanje rastlin,</li> <li>– skrb za dobro kondicijo rastlin in ustrezna prehrana.</li> </ul> | baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata | Cuproxat                  | 3,6 do 6,6 L/ha                                                          | 14 dni 3XL (v 14 dnevih intervalih) | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>V jesenskozimskem času.                                                                              |
| Leskova pepelovka<br>( <i>Phyllactinia guttata</i> )                                | <u><b>Agrotehnični ukrepi:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje manj občutljivih sort,</li> <li>– ustrezna prehrana in kondicija rastlin,</li> <li>– oblikovanje zračnih krošenj.</li> </ul>                                                               | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24    | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br><br>Najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo | 1 dan 10XL                          | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Od razvojne faze prvi listi razprti do faze užitno zreli plodovi (BBCH 11-89).                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | žveplo                                         | Vertipin                  | 7,0 L/ha                                                                 | 3 dni 11XL (v 7 dnevih razmikih)    | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Od fenološke faze vidni prvi posamezni cvetni brsti do faze začetka dozorevanja plodov (BBCH 53-81). |
| Pegavost leske<br>( <i>Gloeosporium coryli</i> )                                    | <u><b>Agrotehnični ukrepi:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje manj občutljivih sort,</li> <li>– vzdrževanje dobrega zračnega režima v nasadu.</li> </ul>                                                                                                 | boskalid + piraklostrobin                      | Signum                    | 1,0 kg/ha                                                                | 28 dni 2XL                          | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranjmi naj bo 10-15 dni.                                                             |
| Rjavenje listnih pecljev, zelenih ovojnic in plodov<br>( <i>Sphaceloma coryli</i> ) | <u><b>Agrotehnični ukrepi:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje manj občutljivih sort,</li> <li>– vzdrževanje dobrega zračnega režima v nasadu.</li> </ul>                                                                                                 |                                                |                           |                                                                          |                                     |                                                                                                                                |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                              | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNA SNOV                         | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK       | KARENCA dovoljeno št. rab          | OPOMBE                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rak</b><br>( <i>Cytospora corylicola</i> )                    | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– napadeno vejo se odreže nekaj cm pod obolelim delom in zažge,</li> <li>– dobra oskrba tal z organsko snovjo in gnojenje, zlasti z Mg, K in N,</li> <li>– sajenje preverjenih sadik.</li> </ul> | baker v obliki bakrovega oksiklorida | Cuprblau Z 35 WG          | 1,6-1,7 kg/ha | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnem razmaku) | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. |
| <b>glive iz rodu Alternaria spp.</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | boskalid + piraklostrobin            | Signum                    | 1,0 kg/ha     | 28 dni 2XL                         | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranj naj bo 10-15 dni.                                           |
| <b>glive iz rodu Cladosporium spp.</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | boskalid + piraklostrobin            | Signum                    | 1,0 kg/ha     | 28 dni 2XL                         | <b>MANJŠE UPORABE!</b><br>Razmak med tretiranj naj bo 10-15 dni.                                           |
| <b>glive iz rodu Colletotrichum spp.</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | boskalid + piraklostrobin            | Signum                    | 1,0 kg/ha     | 28 dni 2XL                         | <b>MANJŠE UPORABE!</b><br>Razmak med tretiranj naj bo 10-15 dni.                                           |
| <b>glive iz rodu Fusarium spp.</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            | boskalid + piraklostrobin            | Signum                    | 1,0 kg/ha     | 28 dni 2XL                         | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Razmak med tretiranj naj bo 10-15 dni.                                           |
| <b>Fitoplazme</b><br>(Candidatus Phytoplasma fragariae in druge) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje zdravih sadik iz preverjenih drevesnic,</li> <li>– čim hitrejša izkrčitev in sežig simptomatičnih rastlin, s koreninami vred.</li> </ul>                                               |                                      |                           |               |                                    |                                                                                                            |
| <b>Gniloba lešnikov</b><br>( <i>Monilinia coryli</i> )           | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>ustrezna prehrana rastlin.                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |               |                                    |                                                                                                            |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                           | AKTIVNA SNOV                                  | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                 | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lešnikar</b><br>( <i>Curculio nucum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>Z mehansko obdelavo tal pod grmi se spomladi prežene lešnikarja, ki prezimlja v tleh.                                                                      | <i>Beauveria bassiana</i> ,<br>sev ATCC 74040 | Naturalis                 | 3 L /ha                 | ni potrebna               | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Tretira se zemljišče pod grmi leske. Optimalni čas uporabe je jeseni. |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>Izmenično mulčenje nasada po pasovih, da se stenice zadržijo na nepokošenih travah in zeleh.                                                               | deltametrin                                   | Decis 100 EC              | 75 mL/ha                | 30 dni                    | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Na istem zemljišču tretira <b>največ enkrat</b> v eni rastni sezoni.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                               | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                |                           | <b>MANJŠA UPORABA!</b><br>Na istem zemljišču tretira <b>največ dvakrat</b> v eni rastni sezoni. |
| <b>Uši</b> (Aphididae): mala rumena listna uš ( <i>Myzocallis coryli</i> ), velika zelena uš poganjkov ( <i>Crylobium avellanae</i> ), <b>kaparji</b> (Coccoidae): ameriški kapar ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ), češpljev kapar ( <i>Parthenolecanium corni</i> ), <b>pršice</b> (Acardiae): leskova brstna pršica ( <i>Phytoptus avellanae</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– naseljevanje naravnih sovražnikov,</li> <li>– pri mladih leskah močno napadene liste potrgamo in zažgemo.</li> </ul> | parafinsko olje                               | Ovitex                    | 20 L/ha ali 2 x 10 L/ha | ni potrebna               | Zimsko ali pred pomladansko tretiranje, <b>pred začetkom vegetacije.</b>                        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                  | UKREPI                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------|
| <b>Leskov rogin</b><br>( <i>Oberea linearis</i> )                    | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– napadene poganjke se odreže nekaj cm pod zlomljenim delom in se jih zažge,</li> <li>– plitva obdelava tal spomladi.</li> </ul> |              |                           |         |                           |        |
| <b>Listna osa ali grizlica</b><br>( <i>Croesus septentrionalis</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uničenje napadenih listov,</li> <li>– nameščanje belih lepljivih plošč.</li> </ul>                                             |              |                           |         |                           |        |

#### 11.12 INTEGRIRANO VARSTVO KOSTANJA

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                         | UKREPI | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                | KARENCA dovoljeno št. rab          | OPOMBE                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostanjev rak</b><br>( <i>Cryphonectria parasitica</i> ) |        | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan 10XL<br>(v intervalu 7 dni)  | <b>MANJŠA UPORABA!</b> Od razvojne faze začetka cvetenja do faze užitno zreli plodovi ( <b>BBCH 61-89</b> ). |
| <b>Rak</b><br>( <i>Cytospora corylicola</i> )               |        | baker v obliki bakrovega oksiklorida        | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha                                                          | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnem razmaku) | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.   |



| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                    | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                | KARENCA dovoljeno št. rab          | OPOMBE                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Črnilovka kostanja</b><br>( <i>Phytophthora cambivora</i> )                         | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje odpornih sort,</li> <li>– cepljenje na evrojaponske križance,</li> <li>– izbira primernih rastišč,</li> <li>– izrezovanje in sežig obolelih korenin in skorje.</li> </ul>                                                            | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br>(najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan 10XL<br>(v intervalu 7 dni)  | <b>MANJŠE UPORABE!</b> Od razvojne faze začetka cvetenja do faze užitno zreli plodovi ( <b>BBCH 61-89</b> ). |
| <b>Rjavenje plodov kostanja</b><br>( <i>Gnomoniopsis smithogilvyi</i> )                | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– previdnost pri nakupu sadik,</li> <li>– v nasadu odstranjujemo in zažgemo odpadle ježice,</li> <li>– z dreves se poreže in zažge prizadete poganjke,</li> <li>– skrbi se za optimalne rastne razmere, zlasti med zorenjem plodov.</li> </ul> |                                             |                           |                                                                        |                                    |                                                                                                              |
| <b>Bakterijske bolezni iz rodov <i>Pseudomonas</i> spp. in <i>Xanthomonas</i> spp.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | baker v obliki bakrovega oksiklorida        | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha                                                          | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnem razmaku) | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.   |
| <b>Listna pegavost kostanjev</b><br>( <i>Mycosphaerella maculiformis</i> )             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | baker v obliki bakrovega oksiklorida        | Cuprablau Z 35 WG         | 1,6-1,7 kg/ha                                                          | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevnem razmaku) | Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju ( <b>BBCH 00-19</b> ) oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi.   |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                          | UKREPI                                                                                                          | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                         | KARENCA dovoljeno št. rab      | OPOMBE                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koreninska gniloba</b><br>( <i>Phytophthora cinnamomi</i> )                                                                                                               |                                                                                                                 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha<br><br><b>Najvišji skupni odmerek 3,7 kg/ha</b> na rastno dobo | 1 dan 10XL (v intervalu 7 dni) | <b>MANJŠA UPORABA!</b> Od razvojne faze začetka cvetenja do faze užitno zreli plodovi ( <b>BBCH 61-89</b> ). |
| <b>Ameriški lešnikov zavijač</b> ( <i>Cydia latiferreana</i> )<br><b>Žirov zavijač</b> ( <i>Cydia fagiglandana</i> ),<br><b>Kostanjev zavijač</b> ( <i>Cydia splendana</i> ) |                                                                                                                 | klorantraniliprol                           | Coragen                   | 300 mL/ha oz. 18-20mL/hL                                                        | 21 dni 2XL                     | <b>MANJŠE UPORABE!</b> Od fenološke faze značilne velikosti plodov dalje (od <b>BBCH 73</b> ).               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                             | Voliam                    |                                                                                 |                                |                                                                                                              |
| <b>Kostanjar</b><br>( <i>Balaninus elephas</i> )                                                                                                                             | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– spomladanska obdelava tal pod drevesi,<br>– odstranjevanje naluknjanih plodov. |                                             |                           |                                                                                 |                                |                                                                                                              |
| <b>Ambrozijski podlubnik</b><br>( <i>Xylosandrus germanus</i> )                                                                                                              | Dobra prehrana in vzdrževanje kondicije dreves.                                                                 |                                             |                           |                                                                                 |                                |                                                                                                              |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                               | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                 | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostanjeva šiškariča</b><br>( <i>Dryocosmus kuriphilus</i> )                   | Proti koncu aprila ali do sredine maja opazujemo odganjanje kostanja in v primeru pojava zadebelitev brstov, poganjkov ali pojava šišk na listnih žilah, le-te <b>porežemo in uničimo</b> . To je potrebno napraviti, še preden začnejo iz šišk izletati osice, najpozneje do sredine junija. Dolgoročno najbolj učinkovit ukrep je vnos <b>parazitoida Tormus sinensis</b> (tujerodna vrsta; pred vnosom je potrebno pridobiti dovoljenje UVHVVR). |                 |                           |                         |                           |                                                                           |
| <b>Uši</b> (Aphididae),<br><b>kaparji</b> (Coccidae),<br><b>pršice</b> (Acaridae) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 L/ha ali 2 x 10 L/ha | ni potrebna               | Zimsko ali pred pomladansko tretiranje, <b>pred začetkom vegetacije</b> . |

#### 11.13 INTEGRIRANO VARSTVO OLJK

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                               | UKREPI                                                                                                                                                 | AKTIVNA SNOV                   | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK     | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| <b>Pavje oko</b><br>( <i>Venturia oleaginea</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– sadnja oljk na višje ležeče, zračne lege,<br>– z rezjo vzpostaviti zračnost in osvetlitev tudi v notranjosti krošnje, | bakrov oksiklorid              | Cuprablau-Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha | 14 dni                    |        |
|                                                   |                                                                                                                                                        |                                | Cuprablau-Z 35 WP         | 2 kg/ha     | 14 dni                    |        |
|                                                   |                                                                                                                                                        |                                | Cuprablau Z 50 WP         | 1,4 kg/ha   | 14 dni                    |        |
|                                                   |                                                                                                                                                        | bakrov oksid                   | Nordox 75 WG              | 1,25 kg/ha  | 14 dni                    |        |
|                                                   |                                                                                                                                                        | dodin                          | Syllit 400 SC             | 2,25 L/ha   | ČU                        |        |
|                                                   |                                                                                                                                                        | tebukonazol + trifloksistrobin | Nativo 75 WG              | 0,25 kg/ha  | ČU                        |        |
|                                                   |                                                                                                                                                        | difenokonazol                  | Score 250 EC              | 0,5 l/ha    | 30                        |        |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                       | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>sajenje na bolezni odpornejših kultivarjev (na bolezen je zelo občutljiva Istrska belica).</li> </ul> <p><b>Kemično varstvo:</b><br/>Ukrepi potrebni v primeru ugodnega vremena za pojav bolezni, (daljše deževno obdobje) predvsem zgodaj spomladi in jeseni.</p>                | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>           | Serenade ASO              | 8 l/ha           | Ni potrebna               |                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha | 1 dan                     |                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | žveplo                                      | Microthiol SC             | 6-10 L/ha        | ni potrebna, 4XL          |                |
| <b>Oljčna sajavost</b> ( <i>Capnodium elaeophilum</i> ) in <b>druge saprofitske glive</b> | <b>Varstvo:</b><br>pomembno je odpraviti vzrok sajavosti – glej varstvo pred kaparji.                                                                                                                                                                                                                                    | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau-Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha      | 14 dni                    |                |
| <b>Oljkova siva pegavost</b> ( <i>Mycocentrospora cladosporioides</i> )                   | <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sadnja oljk na višje ležeče, zračne lege,</li> <li>z rezjo vzpostaviti zračnost in osvetlitev tudi v notranjosti krošnje.</li> </ul>                                                                                                           | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau-Z 35 WG         | 1,6-2 kg/ha      | 14 dni                    |                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | Cuprablau-Z 35 WP         | 2 kg/ha          | 14 dni                    |                |
| <b>Oljkov rak</b> ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> )                                       | <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sadnja odpornih kultivarjev (leccino, istrska belica), zelo občutljiv je frantoio,</li> <li>rez se izvaja v suhih vremenskih razmerah,</li> <li>izrezovanje in sežiganje okuženih vej,</li> <li>razkuževanje orodja za obrezovanje.</li> </ul> | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau –Z 35 WG        | 1,6-2 kg/ha      | 14 dni                    | Manjša uporaba |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bakrov oksid                                | Nordox 75 WG*             | 1,25 kg/ha       | 14 dni                    |                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>           | Serenade ASO              | 8 L/ha           | ni potrebna               |                |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                            | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKTIVNA SNOV              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                             | KARENCA dovoljeno št. rab      | OPOMBE                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Bakterijski ožig oljk</b><br>( <i>Xylella fastidiosa</i> )<br>spada med karantenske bolezni | <p>Splošna bolezenska znamenja so venenje, ožigi in nato sušenje listov ter napredujoče odmiranje posameznih delov krošnje. To se pozneje lahko razširi na celo drevo, ki zaradi tega odmre. Bakterije, ki živijo in se razmnožujejo v vodovodnih prevodnih tkivih (ksilemu), preprečujejo pretok vode in hranilnih snovi ter povzročajo odmiranje prevodnega tkiva.</p> <p>Pri oljkah se okužba najprej pokaže v obliki razbarvanja in sušenja listov ter odmiranja posameznih poganjkov. Pogosto se najprej sušijo deli vej na robu krošnje. Sledi odmiranje vej in postopno odmiranje cele krošnje. Po močnejšem obrezovanju odmrlih vej se oljke v spodnjem delu debla grmičasto obrastejo, vendar so okuženi tudi novi poganjki in kasneje propadejo. Bolezenska znamenja se v sušnih obdobjih močneje izrazijo.</p> <p>Bolezen je bila v letu 2013 ugotovljena na jugu Italije, poleg oljk je bila okužba ugotovljena med drugimi tudi na oleandrih, češnjah, breskvah, mandljevcih in na številnih okrasnih rastlinah ter nekaterih plevelih. <b>V primeru pojava sumljivih znakov je treba takoj poklicati fitosanitarnega inšpektorja, službo za varstvo rastlin ali UVHVVR.</b></p> <p>V primeru izbruha je treba ukrepati v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja <i>Xylella fastidiosa</i>, ki določa ukrepe na ravni EU.</p> <p><b>Do sedaj na območju Slovenije ni bila ugotovljena prisotnost bakterije <i>Xylella fastidiosa</i>.</b></p> |                           |                           |                                                     |                                |                                     |
| <b>Oljčna muha</b><br>( <i>Bactrocera oleae</i> )                                              | <b>Varstvo:</b><br>Pred škodljivko izvajamo <b>neposredne in posredne</b> (uporaba sredstev za varstvo rastlin) <b>načine varstva</b> . Priporočljiva je kombinacija različnih načinov.<br>Med <b>posrednimi načini varstva</b> je najpogostejša uporaba različnih vab za množičen ulov odraslih žuželk. Na muho imajo stransko delovanje tudi pripravki na osnovi bakra, ki delujejo odvrčalno. Poleg bakrovih pripravkov imajo odvrčalno delovanje tudi sredstva na osnovi kaolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | deltametrin               | Decis 2,5 EC****          | 0,5 l/ha                                            | 7 dni 2XL                      |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | spinosad                  | GF 120                    | 1-1,2 l/ha                                          | 7 dni 4XL                      |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Beauveria bassiana</i> | Naturalis                 | 2 l/ha                                              | ni potrebna 5XL                |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | acetamiprid               | Mospilan 20 SG            | 0,3 kg/ha                                           | 28 1XL                         |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | deltametrin               | Eco-trap                  | 100 vab/ha                                          | Zagotovljena z načinom uporabe | Največ 2x v eni rastni dobi         |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | deltametrin               | Flypack dacus trap        | 55-100 vab/ha                                       | Zagotovljena z načinom uporabe |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | deltametrin               | Decis trap oljčna muha    | 50-100 vab/ha                                       | Zagotovljena z načinom uporabe |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | piretrin                  | Asset five                | 0,96 l/ha                                           | 1 dan 3XL                      |                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ciantraniliprol           | Exirel                    | 75 ml/ha ter beljakovinske vabe v odmerku 1,25 l/ha | 7 dni 3XL                      | Priporočena poraba vode je 30 l/ha. |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                   | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AKTIVNA SNOV                                       | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK      | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p>*** Upoštevati 30 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.</p> <p>**** Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.</p> <p><b>Stransko (odvračalno) delovanje na oljčno muho imajo tudi sredstva na osnovi kaolina oz. smukca.</b></p> |                                                    |                           |              |                           |                                                                                                                                                 |
| Oljčni molj<br>( <i>Prays oleae</i> )                                 | <b>Varstvo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– škodljivca se spremlja s feromonskimi vabami. Škropimo po napovedih opazovalno napovedovalne službe.</li> <li>– BBCH 55 – 61 (razvoj socvetij do začetka cvetenja).</li> </ul>                                                                                         | <i>Bacillus.thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> | Lepinox Plus              | 1 kg/ha      | ni potrebna 3XL           | Tretira se v času izleganja jajcec oziroma v fazi mladih licink (prva in druga stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>  | Agree WG*                 | 1 kg/ha      | ni potrebna               | Tretiranje se opravi v času izleganja gosenic škodljivih metuljev                                                                               |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | spinetoram                                         | Delegate 250 WG           | 0,075 kg/ ha | 21 dni                    |                                                                                                                                                 |
| Oljkova vešča – molj mladih poganjkov<br>( <i>Palpita unionalis</i> ) | <b>Varstvo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Škropimo v primeru prisotnosti gosenic,</li> <li>– BBCH 75 – 85 ( od razvoja plodov do zorenja plodov).</li> </ul>                                                                                                                                                     | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> | Lepinox Plus              | 1 kg/ha      | ni potrebna 3XL           | Tretira se v času izleganja jajcec oziroma v fazi mladih licink (prva in druga stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>  | Agree WG*                 | 1 kg/ha      | ni potrebna 3XL           | Tretiranje se opravi v času izleganja gosenic škodljivih metuljev                                                                               |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oljkov kapar</b><br><i>(Saissetia oleae)</i><br><b>Vrečasti oljkov kapar</b><br><i>(Lichtensia viburni)</i><br><b>Šiškast oljkov kapar</b><br><i>(Pollinia pollini)</i> | <b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sajenje oljk na višje ležeče, zračne lege,</li> <li>– z rezjo skrbimo za dobro prezračenost in osvetljenost krošenj,</li> <li>– uravnoteženo gnojenje oljk z dušičnimi gnojili.</li> </ul>              | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 L/ha (1. škropljenje)<br><br>ALI<br><br>2x 10 L/ha (2. škropljenje) | ni potrebna               | do razvojne faze, ko je cvetni venec zeleno obarvan in je višji kot čaša (BBCH 53-57)<br><br>ob uporabi 1000 do 1500 l vode/ha |
| <b>Kljunati oljkov rilčkar</b><br><i>(Rhynchites cribripennis)</i>                                                                                                         | Prisotnost škodljivca se preverja z otresanjem vej v juniju in juliju, ko se pojavlja hrošček, kakor tudi škoda, ki jo povzroča v oljčnikih.<br><br><b>V letu 2014 potrjena prisotnost škodljivca v Sloveniji. V naslednjih letih – do 2023 škodljivca nismo več opazili</b> | acetamiprid     | Decis 2,5 EC              | 0,5 L/ha                                                               | 7 dni 2XL                 |                                                                                                                                |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br><i>(Halyomorpha hallys)</i>                                                                                                               | <b>Varstvo:</b><br>Tretira se v času prisotnosti žuželk.<br><br>Škropi se po napovedih opazovalno napovedovalne službe.<br>BBCH 75 – 85 ( od razvoja plodov do zorenja plodov).                                                                                              | piretrin        | Asset five*               | 0,96 l/ha                                                              | 1 dan 3XL                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | acetamiprid     | Mospilan 20 SG            | 0,3 kg/ha                                                              | 28 dni 1XL                |                                                                                                                                |
| <b>Pršice šiškarice</b><br><i>(Acolus olearius)</i>                                                                                                                        | <b>Varstvo:</b><br>Škropi se po napovedih opazovalno napovedovalne službe.<br><br>- BBCH 31-60<br>ko poganjki dosežejo 10 % končne                                                                                                                                           | žveplo          | Thiovit jet               | 0,2 do 0,5 %                                                           | ČU 1XL                    | ob porabi 800 do 1000 L vode na ha . Največji dovoljeni odmerek je 4 kg/ha.                                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Pepelin WG                | 2 - 4 kg/ha                                                            | 7 6XL                     | ob porabi vode 500 - 1000 l/ha                                                                                                 |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | UKREPI                                                                                                                                    | AKTIVNA SNOV    | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                                                                | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                     | velikosti, do faze, ko so prvi cvetovi odprti),<br>- BBCH 53-57 do razvojne faze, ko je cvetni venec zeleno obarvan in je višji kot čaša. | parafinsko olje | Ovitex                    | 20 L/ha (1. škropljenje)<br><br>ALI<br><br>2x 10 L/ha (2. škropljenji) | ni potrebna               | ob uporabi 1000 do 1500 l vode/ha |

#### 11.14 INTEGRIRANO VARSTVO AKTINIDIJE

| UKREPI                                                            | AKTIVNA SNOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK             | KARENCA dovoljeno št. rab                                                    | OPOMBE | UKREPI                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gniloba koreninskega vratu</b><br>( <i>Phytophthora spp.</i> ) | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala,</li> <li>– ukrepi za preprečitev zastajanja vode v tleh,</li> <li>– paziti je treba, da pri obdelavi se ne poškoduje koreninskega vratu.</li> </ul><br><b><u>Varstvo:</u></b><br>ukrepe lokalizirati samo na prizadete rastline v začetku vegetacij | bakrov oksiklorid         | Cuprablau-Z 35 WP * | 2 kg/ha                                                                      | ČU 4XL | Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni po pravilu pridelka in odpadanju listja. |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bakrov oksiklorid         | Cuprablau-Z 35 WG*  | odmerku 55-100 g na 100 L vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 L vode na rastlino. | ČU 1XL | <b>Manjša uporaba.</b><br>Zalivanje posamičnih okuženih rastlin. Zalivanje v jesenskem in zimskem času.                              |



| UKREPI                                                                                                                                                               | AKTIVNA SNOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO                   | ODMEREK           | KARENCA dovoljeno št. rab                                                          | OPOMBE                                       | UKREPI                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siva plesen</b><br>( <i>Botryotinia fuckeliana</i> )                                                                                                              | Ukrepi potrebni v primeru ugodnega vremena za pojav bolezni, (daljše deževno obdobje)                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro*           | 0,185-0,37 kg/ha<br><br>( <u>najvišji</u> skupni odmerek 3,7 kg/ha na rastno dobo) | 1 dan                                        | <b>Manjša uporaba.</b><br>Poraba vode je 180 do 1000 L/ha.<br>Od razvojne faze cvetenja do pobiranja pridelka (BBCH 61-89).<br>Zmanjševanje okužb                               |
| <b>Alternarijska listna pegavost</b><br>( <i>Alternaria alternata</i> )                                                                                              | Ukrepanje potrebno ob pojavu bolezenskih znamenj.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau-Z 35 WP | 2 kg/ha                                                                            | ČU 2XL<br>(v 7-10 dnevni razmakih)           | <b>Manjša uporaba</b><br>Tretira se do razvojne faze, ko cvetni brsti rastejo, vendar so še vedno zaprti in od začetka odpadanja listov                                         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bakrov oksiklorid                           | Cuprablau-Z 35 WG | 2 kg/ha                                                                            | ČU                                           | <b>Manjša uporaba</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Bakterijski ožig aktinidije</b><br>( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> )<br><br><b>Bakterijska pegavost</b><br>( <i>Pseudomonas viridiflava</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi</b> za preprečevanje širjenja okužb:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– sadimo neokužene sadike,</li> <li>– rez izvajamo v suhem vremenu,</li> <li>– razkuževanje orodja za rez,</li> <li>– razkuževanje večjih ran nastalih ob rezi,</li> <li>– odnašanje in uničevanje obolelih delov debla.</li> </ul> | bakrov oksid                                | Nordox 75 WG*     | 1,6 kg/ha                                                                          | ČU 2XL<br>(14 dnevni razmik)                 | Ob porabi vode 500-1000 L/ha.<br>Tretira se do razvojne faze, ko cvetni brsti rastejo, vendar so še vedno zaprti (BBCH 00-53) in od začetka odpadanja listov (od BBCH 93 dalje) |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>           | Amylo X           | 1,5 kg/ha                                                                          | ni potrebna 2XL<br>(v 7- 10 dnevni razmakih) | Ob porabi vode 1000 L/ha. Tretira se do razvojne faze, ko cvetni brsti rastejo, vendar so še vedno zaprti (BBCH 00-53) in od začetka odpadanja listov (od BBCH 93 dalje).       |

| UKREPI                                                                                                                        | AKTIVNA SNOV                          | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK                          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE      | UKREPI                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                       | bakrov oksiklorid         | Cuprablo-Z 35 WP                 | 2 kg/ha                   | ČU          | Manjša uporaba                                                                             |
|                                                                                                                               |                                       | bakrov oksiklorid         | Cuprablo-Z 35 WG                 | 2 kg/ha                   | ČU          |                                                                                            |
| <b>Murvov kapar</b><br><i>(Pseudaulacaspis pentagona)</i><br><b>Uši</b> <i>(Aphididae)</i><br><b>Pršice</b> <i>(Acardiae)</i> |                                       | parafinsko olje           | Ovitex                           | 5 L/ha                    | ni potrebna | zimsko ali pred pomladansko tretiranje, pred začetkom vegetacije                           |
|                                                                                                                               |                                       |                           |                                  |                           |             |                                                                                            |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br><i>(Drosophila suzukii)</i>                                                                   | Ukrepanje ob prisotnosti mušic.       | deltametrin               | Decis trap plodova vinska mušica | 100 vab/ha                | ni potrebna | Vabe učinkovito delujejo 100 dni in naj ostanejo v nasadih do zaključka spravila pridelka. |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br><i>(Halyomorpha halys)</i>                                                                   | Tretira se v času prisotnosti žuželk. | piretrin                  | Asset five                       | 0,96 l/ha                 | 1 dan 3XL   |                                                                                            |

## 11.15 INTEGRIRANO VARSTVO KAKIJA

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                     | UKREPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIVNA SNOV                                | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK          | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kakijeva listna pegavost</b><br>( <i>Plurivorosphaerella nawae</i> ) | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>Najpomembnejši vir okužb predstavljajo odpadli listi, zato priporočljivo odstranjevanje listja iz nasada ter kompostiranje ali sežig. Če površina ni zatravljena se liste lahko plitvo zadela v tla. Hitrejši razpad listov se doseže tudi s škropljenjem tal z raztopino uree ali uporabo pripravkov za pospešeno razgradnjo organskih ostankov<br><br><b>Kemično varstvo:</b><br>ukrepanje v primeru pojava bolezenskih znakov v preteklem letu | difenokonazol                               | Score 250 EC*             | 0,2 L/ha         | ČU 3XL                    | <b>Manjša uporaba.</b><br><br>Tretira se od razvojne faze pojava prvih listov do zaključka cvetenja (BBCH 10-69), pri porabi vode 500-750 L/ha. |
| <b>Črna listna pegavost</b><br>( <i>Alternaria</i> spp.)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 | Taegro                    | 0,185-0,37 kg/ha | 1                         | <b>Manjša uporaba,</b><br>zmanjševanje okužb                                                                                                    |
| <b>Jablanova steklokrilka</b><br>( <i>Synanthemon myopaeformis</i> )    | <b>Agrotehnični ukrepi:</b><br>– odstranjevanje dela lubja pod katerim so ličinke steklokrilke,<br>– zadelava ran s cepilno smolo ali fungicidno pasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                           |                  |                           |                                                                                                                                                 |
| <b>Breskova muha</b><br>( <i>Ceratitis capitata</i> )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Beauveria bassiana</i> , soj ATCC 74040  | Naturalis                 | 2 L/ha           | ni potrebna 5XL           | Pri porabi vode 600-1000 L/ha                                                                                                                   |
| <b>Japonski kapar</b>                                                   | Ukrepanje ob prisotnosti kaparja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -parafinsko olje                            | Ovitex                    | 20 L/ha ali      | ni potrebna               | največ 1. škropljenje                                                                                                                           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                           | 2x 10 L/ha       |                           | največ 2. škropljenji                                                                                                                           |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                         | UKREPI                                | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO        | ODMEREK    | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Ceroplastes japonicus)</i>                              |                                       |              |                                  |            |                           | zimsko ali pred pomladansko tretiranje, pred začetkom vegetacije ob uporabi 1000 do 1500 l vode/ha |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br><i>(Drosophila suzukii)</i> | Ukrepanje ob prisotnosti mušic.       | deltametrin  | Decis trap plodova vinska mušica | 100 vab/ha | ni potrebna               | Vabe učinkovito delujejo 100 dni in naj ostanejo v nasadih do zaključka spravila pridelka.         |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br><i>(Halyomorpha halys)</i> | Tretira se v času prisotnosti žuželk. | piretrin     | Asset five                       | 0,96 L/ha  | 1 dan 3XL                 | <b>Manjša uporaba</b>                                                                              |

#### 11.16 INTEGRIRANO VARSTVO SMOKVE

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                  | UKREPI                                                                                                | AKTIVNA SNOV | FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ODMEREK | KARENCA dovoljeno št. rab | OPOMBE |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------|
| <b>FMV – smokvin mozaik</b>                          | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– Uporaba certificiranega sadilnega materiala.                  |              |                           |         |                           |        |
| <b>Smokvin rak</b><br><i>(Phomopsis cinerascens)</i> | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– odstranjevanje obolelih vej,<br>– razkuževanje orodja za rez. |              |                           |         |                           |        |

|                                                                                                                          |                                                                                                                |                 |                                  |             |             |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smokvina bolšica</b><br>( <i>Homotoma ficus</i> )                                                                     | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>– uravnoteženo gnojenje,<br>– skrb za zračnost in osvetljenost krošnje.  |                 |                                  |             |             |                                                                                                    |
| <b>Smokvin molj</b><br>( <i>Simaethis nemorana</i> )                                                                     |                                                                                                                |                 |                                  |             |             |                                                                                                    |
| <b>Črna figova muha</b><br>( <i>Silbia adipata</i> )                                                                     | <b><u>Agrotehnični ukrepi:</u></b><br>Škoda se omeji s pobiranjem in uničevanjem poškodovanih odpadlih plodov. |                 |                                  |             |             |                                                                                                    |
| <b>Kaparji</b><br>( <i>Ceroplastes rusci</i> ,<br><i>C. japonicus</i> ,...)<br><b>Listne uši</b><br>( <i>Aphididae</i> ) |                                                                                                                | parafinsko olje | Ovitex                           | 20 l/ha ali | ni potrebna | največ 1. Škropljenje                                                                              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                |                 |                                  | 2x 10 l/ha  |             | največ 2. škropljenji                                                                              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                |                 |                                  |             |             | zimsko ali pred pomladansko tretiranje, pred začetkom vegetacije ob uporabi 1000 do 1500 l vode/ha |
| <b>Plodova vinska mušica</b><br>( <i>Drosophila suzukii</i> )                                                            | Ukrepanje ob prisotnosti mušic.                                                                                | deltametrin     | Decis trap plodova vinska mušica | 100 vab/ha  | ni potrebna | Vabe učinkovito delujejo 100 dni in naj ostanejo v nasadih do zaključka spravila pridelka.         |
| <b>Marmorirana smrdljivka</b><br>( <i>Halyomorpha halys</i> )                                                            | Tretira se v času prisotnosti žuželk.                                                                          | piretrin        | Asset five*                      | 0,96 l/ha   | 1 dan 3XL   | <b>Manjša uporaba</b>                                                                              |

#### 11.17 INTEGRIRANO VARSTVO PRED PLEVELI (splošna navodila za sadne vrste (razen jagod))

V preglednici so navedena sredstva, ki se uporabljajo za zatiranje plevelov v nasadih različnih sadnih vrst.

Število uporab in uporaba za posamezni namen (sadno vrsto) mora biti v skladu z navodilom za uporabo sredstva, oziroma registracijo.

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPIS                            | UKREPI      | AKTIVNA SNOV                                 | FITOFARM. SREDSTVO                                               | ODMEREK                     | KARENCA Št.uporab letno  | OPOMBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZATIRANJE PLEVELOV:<br><br>V medvrstnem prostoru se vzdržuje negovano ledino, rastje v ozkem pasu pod drevesi pa zatiramo z ekološko primernimi herbicidi. Pri tem se skuša obseg uporabe herbicidov zmanjšati na najmanjšo možno raven. V starejših nasadih z veliko tekmovalno sposobnostjo se lahko zatiranje občasno opusti. Čez zimo naj pas pod drevesi delno ozeleni, ker to omogoča izrabo viškov gnojil, varuje tla pred erozijo in daje zavetje koristnim žuželkam in pršicam.<br><br>Pri uporabi pripravkov na podlagi glifosata se doseže najboljše učinke v jesenskem obdobju takoj po obiranju. Pripravke na podlagi MCPA se uporabi le spomladi. S stališča omejevanja razvoja odpornosti plevelov na herbicide se skuša pri izbiri pripravkov čim bolj pestro kolobariti.<br><br>Za širino herbicidnega pasu se upošteva pravila iz poglavja 5.1 v uvodnem delu, kjer so določene izjeme.<br><br>Pri lupinarjih je ustrezno zatiranje plevelov pomembno tudi zaradi razvoja boleznin in škodljivcev, ter zaradi olajšanja dela ob spravilu pridelka. Pri kostanju zapleveljenost v mladosti značilno vpliva na razvoj kostanjevega raka. |                                 |             | glifosat*                                    | Helosate 450 SL <sup>c</sup> **                                  | 4 l/ha                      | 42 dni 1xL               | * Odmerek je odvisen od uporabljenega fitofarmacevtskega sredstva in prevladujoče vrste plevela v času tretiranja.<br><sup>c</sup> Upoštevati netretirani varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. Reda.<br><sup>d</sup> Upoštevati 15 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.<br>** Hruške, jablane |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                                              | Helosate 450 TF <sup>c</sup> **                                  | 4 l/ha                      | 42 dni 1xL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             | glifosat (izopropilamino sol)                | Boom efekt <sup>c</sup>                                          | 2-9 l/ha                    | 35 dni 1xL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                                              | Tajfun 360 <sup>c</sup>                                          | 2 – 10 l/ha                 | 35 dni 3xL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                                              | Clinic TF <sup>c</sup> max <sup>c</sup>                          | 2-8 l/ha                    | ČU 1xL                   | * Višji odmerek predstavlja tudi največjo dovoljeno skupno letno količino, če pripravek uporabimo v več deljenih odmerkih.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             | glifosat (kalijeva sol + izopropilamino sol) | Credit xtreme                                                    | 2-5,33 L/ha                 | ČU 1xL                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             | glifosat * (kalijeva sol)                    | Roundup energy <sup>d</sup>                                      | 1,2 – 8 l/ha*               | 35 dni 2 xL              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                                              | Roundup max <sup>c</sup>                                         | 1,5 -10 l/ha                | 35 dni 2xL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                                              | Zaloge v prodaji do: 15.6.2024<br>Zaloge v uporabi do: 15.6.2025 |                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                                              | Roudup star Rodeo plus <sup>c</sup>                              | 1,5-10 L/ha<br>1,5 – 5 l/ha | 35 dni 1xL<br>28 dni 1xL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| glifosat (amonijeva sol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Touchdown system 4 <sup>c</sup> | 2 – 8 l/ha* | 35 dni 1xL                                   |                                                                  |                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ŠKODLJIVI ORGANIZEM | OPIS | UKREPI | AKTIVNA SNOV      | FITOFARM. SREDSTVO          | ODMEREK        | KARENCA Št.uporab letno | OPOMBE                                                                                  |
|---------------------|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      |        | MCPA-DMA          | U 46 M-Fluid <sup>c</sup>   | 1,5 l/ha       | ČU                      | Dovoljeno je največ eno tretiranje spomladi v času, ko doseže plevel višino 10 - 20 cm. |
|                     |      |        | izoksaben         | Flexidor                    | 0,25 L/ha      | ČU 1xL                  | od razvojne faze mirovanja do faze konca cvetenja (BBCH 00-69                           |
|                     |      |        | pendimetalin      | Stomp aqua <sup>c</sup>     | 2,9 l/ha       | ČU 1xL                  | Tretira se do brstenja dreves.                                                          |
|                     |      |        | fluazifop-p-butil | Fusilade forte <sup>c</sup> | 0,8 – 1,7 l/ha | 28 dni* 1xL             | Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.<br>*lupinarji 21 dni        |
|                     |      |        | fluazifop-p-butil | Fusilade max                | 1 – 2 l/ha     | ni* 1xL                 | Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.<br>*lupinarji 21 dni        |

#### 11.18 INTEGRIRANO VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI GLODALCI

Za zatiranje škodljivih glodalcev v sadovnjakih (*Arvicola terrestris* – voluhar in *Apodemus* sp. – poljske miši) smejo pridelovalci uporabljati vse vrste zastrupljenih vab, ki so registrirane za te namene v RS (registracija za uporabo na odprtem v naravi). Postopek nastavljanja vab ali lastne priprave vab mora biti usklajen z navodili proizvajalcev. Pri uporabi zastrupljenih vab morajo pridelovalci zagotoviti varovanje domačih in divjih živali, da te ne pridejo v stik z vabami. Pidelovalci se lahko poslužujejo vseh oblik mehaničnih in vodnih pasti, tudi tistih z uporabo nabojev in drugih oblik sredstev z repelentnim učinkom (oddajniki zvočnih in magnetnih valov). Aplikacija katerega koli kemičnega sredstva povprek po ledini sadovnjaka ni dovoljena.

## **12 INFO-TOČKA – INTEGRIRANA PRIDELAVA**

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Dunajska 22  
1000 Ljubljana

### **Spletno mesto:**

Portal GOV.SI (<https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/>)«